

احتياجات البرودة لبعض أنواع الفاكهة المتساقطة الأوراق  
 اللازمة لإنهاء دور راحة البراعم ، معبراً عنها بعدد الساعات التي يلزم أن  
 تعرض خلالها الأشجار  
 لدرجة حرارة ٧,٢ م° (٤٥ ف°)

عدد الساعات	الفاكهة	عدد الساعات	الفاكهة
١٧٠٠-٢٥٠	التفاح (***)		البرقوق
١٥٠٠-٢٠٠	الكمثرى	١٧٠٠-٧٠٠	الأمريكي
٤٠٠-١٠٠	السفرجل (***)	١٧٠٠-٩٠٠	الأوروبي
١٠٠٠-٣٠٠	البيكان	١٢٠٠-٢٠٠	اليابانى
١٥٠٠-٤٠٠	الجوز	١١٠٠-٢٥٠	الخوخ
١٧٠٠-٨٠٠	البندق	٩٠٠-٣٠٠	المشمش
			الكريز
٤٠٠-١٠٠	الكاكي	١٣٠٠-٥٠٠	الحلو
١٥٠٠-١٠٠	العنب (*)	١٤٠٠-٦٠٠	المز
٣٠٠-صفر	التين (**)	٤٠٠-١٠٠	اللوز

المصدر · Childers, N.F. (1983), Modern Fruits Science

(\*) احتياجات العنب عادة من البرودة منخفضة ، غير أن بعض الأصناف احتياجاتها عالية ، وبعض الأصناف الأخرى احتياجاتها متوسطة .

(\*\*) معظم أصناف التين ذات احتياجات برودة متوسطة .

(\*\*\*) احتياجات بعض أصناف البيكان في حدود ٥٠٠ ساعة ، كما أن بعض الأصناف الأخرى ذات احتياجات متوسطة ، والصنف ستورت يزدهر في المناطق التي يتوافر بها حوالي ٣٠٠ ساعة .

(\*\*\*\*) صنفى التفاح Anna و Dorsett Golden احتياجاتها من البرودة قليلة في حدود ٥٠ ساعة .