

...

:

()

Archives of surgery ()

توبعت المريضات بعد أصابتهن بالسرطان لمدة ٧ سنوات وخلال هذه السنوات مات من المريضات ٢٤٦ امرأة وجد أن وزن الجسم عند الإصابة بالمرض لم يكن له علاقة قوية بالموت بالمرض ولكن عندما نظر الباحثون إلى النساء اللاتي شخص عندهن المرض مبكراً في مراحلهم الأولى وجدوا أن هناك تأثير وعلاقة بين زيادة خطورة الموت وزيادة الوزن مقارنة بالنساء اللاتي كن أقل وزناً عند بداية تشخيص الحالة إلا أن مثل هذه العلاقة لم تلاحظ عند النساء اللاتي شخصت حالتهم متأخراً.

()

()

()

الدراسة لم تترك النتائج مطلقة بل افترضت أن هنالك عوامل أخرى غير السمنة غير منظورة قد تكون سبب الإصابة أو الموت مثل سوء التغذية وقلة النشاط والحركة كما أن الدراسة تفرض أن المسارعة في تخفيض الوزن بمجرد اكتشاف المرض عند البدينات سوف يقلل من فرصة مضاعفات المرض بما في ذلك الموت.

هذه الدراسة وحيدة ومدخلاتها كثيرة ولا يمكن القطع بما ورد فيها لأنه كما ذكر (لكل أجل كتاب) ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب ومن الأسباب تخفيض الوزن وعلى كل الأحوال فهو يعطي الجسم رشاقة أيضا.
