

()

)
(

:

()

:

:

,

.

.

)

(

().

:

-

%

()

:

%

وبين المهندس علي

بن عبد الله الجليل مدير مركز أبحاث البستنة بمنطقة نجران، أن هناك عشرة أصناف ثبت تميز منطقة نجران في زراعتها هي مانجو تومي، الفنداكي، والهندي الخاص، والفنسيا برايد، الجبن، السوداني، الهيدن، البلمر والكيت (جريدة الوطن)

:

() ()

:

:

)

(

)

.(

:

Mango

Mangifera indica L

Anacardiaceae

Anacardiaceae

Mangifera

).

indica

(

().(Singh, 1960)

)

(

().

-

-

-

().

:

() ()

().

:

:

%

: () (FOA)
Keitt - Tommy Atkins - Glenn -
Julie -
Palmer - Fajareklan - Zill -
Zebda -
Sensation - Hindi khaas -
:

-

-

-

()

-

()

-

.

:

-

-

-

-

.

⋮ _____

⋮

⋮

⋮

.

⋮

•

⋮

/

%

⋮

•

⋮

.(

)

⋮

•

⋮

⋮

•

⋮

.

⋮

•

frankliniella occidentalis:

Scirtothrips mangiferae:

Mites:

Aceria mangiferae

) %

.

:

(

.

:

.

:

/

.

Aleurodicus dispersus : _____

Aleurocanthus woglumi : _____

.

:

Enfarsia opulenra, Amitus

:_____

Drossicha stebbing (Green):_____

:

:_____

***Rastrococcus invadens* (Willians) :**

:

)

(al-yahya,2007)

(-

Hemicriconemoides

mangiferae

% -

-

.

:

.

:

(Xanthminas
campestris pv.mangiferaeindicae) (Patel,Minir and Kulkarni)

.

:

()

(Ascomycetes)

(Meliola mangiferae) Earle

: :

:

:

:

.

:

•

):

(

:

•

.

•

.

•

•

•

•

:

.

•

.

•

:

/

Langra

/

% % %

.

Lim & Khoo(1985)

()

Fusarium sogami,

Fusarium oxysporum, *Lasiodiplodia theobromae*.

.

Phytophthora palmivora(E.J.Butler) :

:

.

:

(*P. palmivora* D & *Pythium vexans* de Bary) :

:

(*Scierotiu rolfsii*)

:

Verticillium albo-atrum (Reinke & Berth) :

:

:

Rigidoporus lignosus (Llotzsch) :

:

:

:

:

)

(

.
:
-
.
:

Alternaria alternate:

:

.
:
/
/
-
:

Oidium mangiferae:

:

.()

.
:

Elsinoe mangiferae:

:

:

Aspergillus niger:

:

:

:

:

:

)

.(

:

تم والله الحمد

