


البنسطين ”ج“



اعداد :

عادل توفيق العوهلي

فعالية الدواء:

- يقوم بتنشيط الأنزيمات الخاصة بتخليق جدار البكتريا.
- - مما يسبب ضغط أسموزي في الخلية البكتيرية وينتج عن ذلك موتها .
- - وتكون فعاليته أثناء التكاثر .
- ويكون إخراج الدواء "البنسلين " عن طريق الكلى.

طريقه الاستخدام :

- يعطى عن طريق حقنه ورديه او عضليه او عن طريق الفم

مجال تغطيه الدواء للبكتريا:

- المضاد يغطي اغلب أنواع البكتريا صاحبه الصبغه الموجبة الهوائية وبعض اللاهوائية.

استخدامات الدواء:

- يستخدم في حالات الالتهابات المصاحبة , المسببة عن طريق البكتيريا الممرضة .

تداخل الادويه :

- يقلل من فعاليه بعض الأادويه كحبوب منع الحمل
وبعض المضادات الحيويه الأخرى مثل التيتراسايكلين و
الاريثرومايسين , وهناك ادويه تقلل من فعاليه البنسلين
مثل الأسبرين وغيرها .

تعارضات الدواء:

- هذا الدواء يتعارض مع المرضى الذين لديهم حساسية من التعامل مع البنسلين لذلك نرجو اخذ الحيطة والحظر وذلك بإبلاغ الطبيب أو الصيدلي.

الاعراض الجانبية :

■ الغثيان , القيء , الاسهال , ألام في البطن , والقلق

شكرا لحسن الاصفاء

