

بندوبن جي

تقديم  
بندر الرحيلي

# الخاصية الدوائية

---

- امتصاص بنسلين- جي ضعيف في الجهاز الهضمي. تطرح غالبية بنسلين- جي في البول.

# الاستطبابات

---

- التهابات الأذن الوسطى.
- التهابات ذات الرئة.
- السيلان.

# موانع الأستعمال

---

- لا يعطى بنسلين- جي للمرضى الذين عرفوا بفرط حساسيتهم للبنسلينات.

# التأثيرات الجانبية

---

- حساسية الجلد.
- ألم في البطن.
- انسداد عضلة القلب.

# الأحتياطات

---

- كما في باقي الأدوية القوية، يجب ان تجرى فحوصات مخبرية خلال المعالجة الطويلة لكل من الكلى و الكبد و الدم.

# الجرعات

---

- الجرعة عن طريق الفم: 375 ملجرام ثلاث مرات يوميا.
- الجرعة عن طريق الوريد: 300000 وحدة يوميا كل ثلاث ساعات.

# التداخلات الدوائية

---

- بنسلين- جي دواء غير ثابت يتاثر بوجود الطعام في المعدة ، بنسلين- جي يتعارض مع كثير من الأدوية منها:
- كلورامفينيكول .
- امينوجليكوزايد .
- تتراسايكلين .