

بندولين جي

تقديم

بندر الرحيلي

الخاصية الدوائية

- امتصاص بنسلين- جي ضعيف في الجهاز الهضمي. تطرح غالبية بنسلين- جي في البول.

الاستطبابات

- التهابات الأذن الوسطى.
- التهابات ذات الرئة.
- السيلان.

موانع الأستعمال

- لا يعطى بنسلين- جي للمرضى الذين عرفوا بفرط حساسيتهم للبنسلينات.

التأثيرات الجانبية

- حساسية الجلد.
- ألم في البطن.
- انسداد عضلة القلب.

الأحتياطات

- كما في باقي الأدوية القوية، يجب ان تجرى فحوصات مخبرية خلال المعالجة الطويلة لكل من الكلى و الكبد و الدم.

الجرعات

- الجرعة عن طريق الفم: ٣٧٥ ملجرام ثلاث مرات يوميا.
- الجرعة عن طريق الوريد: ٣٠٠٠٠٠ وحدة يوميا كل ثلاث ساعات.

التداخلات الدوائية

- بنسلين- جي دواء غير ثابت يتاثر بوجود الطعام في المعدة ، بنسلين- جي يتعارض مع كثير من الأدوية منها:
 - كلورامفينيكول.
 - امينوجليكوزايد.
 - نتراسايكلين.