



التفاعل بين الكائنات الدقيقة

العمل السادس

الجوهره العباد – نوره الكبيسي

2017

اسم التجربة

الحصيرة الميكروبية



❖ تعریفها



- عباره عن نظام بيئي مصغر، يحتوي على العديد من الأنواع الميكروبية (بكتيريا - فطريات - بروتوزوا - اكتينوميسيات - طحالب .. و غيرها)



- يتوقف وجود و استمرار بعض الأنواع الميكروبية على نشاط أنواع ميكروبات أخرى.
- هذا النشاط ناتج عن علاقات متبادلة بين هذه الميكروبات قد تكون نافعة أو ضارة.

❖ تاریخها



• أول من استخدم هذه الطريقة هو عالم الأحياء الدقيقة Sergri Winogradsky، وذلك لدراسة الكائنات الحية الدقيقة المتواجدة في معقد من المجتمعات الحيوية.



• من أهم الاستراتيجيات التي وضعها العالم في مبدأ استخدام الحصيرة الميكروبية، هو عزل الكائن الدقيق من بيئته الطبيعية و ذلك في نموذج بركه مصغر.

(Winogradsky column)



❖ مبدأ التجربة

• تكون الحصيرة الميكروبية نتيجة للنمو الناتج من تلامس خلايا الكائنات الدقيقة، و تراكم نموها في صورة أشكال مختلفة من الأسطح الميكروبية في طفو حر و مستمر للنمو.



• يؤدي ذلك إلى اتساع المسطح الميكروبي لمجموعة مميزة من الكائنات لكل طبقة تلي الأخرى بناءً على التتابع الحيوي لاحتياجات كل مجموعة من الناحية البيئية والغذائية.

• نتائج لهذا التتابع يتكون شكل فراغي مميز لكل طبقة حيث تأخذ لوناً مميزاً لها نتيجة التتابع الميكروبي، ونوع الكائنات الحية في كل طبقة.





- يمكن رؤية هذا التابع بالعين المجردة في صور طبقات متتالية متميزة كل طبقة بنشاطها الميكروبي المحدد.
- قد يبلغ عمر الحصيرة الميكروبية في الحفريات القديمة ما يقرب من 3.5 مليون سنة.



1. الاحتياج الهوائي


2. مصدر الطاقة


3. إنتاج الكبريت

يمكن تقسيم توزيع الطبقات
على أساس :

توزيع الكائنات الدقيقة على الطبقات

موقع الطبقة	الطاقة	الاحتياج الهوائي	انتاج الكبريت	الكائنات الدقيقة في الطبقة
الطبقة العليا	ضوئية	مرتفع	معدوم	Algae, Cyanobacteria, Protozoa Aerobic heterotrophs
الطبقة الوسطى	مختلطة	محدود	محدود	البكتيريا المؤكسدة للكبريت الميكروبات اللاهوائية اختياراً الميكروبات الضوئية الغير ذاتية البكتيريا الأرجوانية غير الكبريتية
الطبقة السفلية	كيميائية	لا هوائية	مرتفع	البكتيريا الأرجوانية الكبريتية البكتيريا الخضراء الكبريتية
القاعدة			مرتفع جداً	البكتيريا المخمرة للكبريت





التجربة المعملية





❖ المطلوب

- تكوين نظام بيئي مصغر يحتوي على العديد من الأنواع الميكروبية، و يتضمن جميع متطلبات النظام البيئي الطبيعي.

❖ الهدف من التجربة

- دراسة التأثيرات المتبادلة بين الميكروبات (نافعة أو ضارة).
- الكشف عن الصفات و القدرات التي تتمتع بها هذه الميكروبات إذا ما وجدت مختلطة.



يمزق ورق الترشيح إلى قطع صغيرة جداً و تبطن بها
قاعدة بيكر زجاجي

توزن كمية معلومة من التربة و توضع فوق طبقة
الورق


توضع عدد من الحصى متوسطة الحجم فوق طبقة
التربة

يُكمل الحجم إلى 800 مل من الماء العذب أو المالح.

يغطى البيكر بورق المنيوم، ثم تحدث به ثقوب
بواسطة القلم



- يحضر البيكر بعد ذلك لمدة شهر تحت اضاءه مستمرة، عند درجة حرارة الغرفة.
- تفحص التجربة على فترات مع كتابة التغيرات التي تحدث اثناء فترة التحضين، من حيث ظهور ألوان الطبقات، كذلك عمل صبغ جرام لكل طبقة في فترات الفحص.




Cyanobacteria

Purple sulfur bacteria

Green sulfur bacteria

Sulfate reducing
bacteria








النتائج

الطبقة العليا



الطبقة الوسطى

