بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أود أن أتقدم بالشكر لجميع من استفدنا من
المراجع التي تم استخدامها في تدريس
المقرر من حيث استخدام الصور
التوضيحية والرسومات البيانية.

ICHTHYOLOGY

علم الاسماك

DEVONIAN

360 مليون سنة

FISH BASE قاعدة بيانات

تعريف الأسماك

FISH IDENTIFICATION

حيوانات مائية دمها متغير (Poikilothermic)، لها نموذجياً
جهاز هيكلي Back Bones وخياشيم Gills وزعانف Fins
وتستخدم الماء كوسط هام ومحدد لمعيشتها .

هل تشترك في التعريف مع حيوانات اخرى؟

قد تشترك في هذا التعريف مع الأسماك حيوانات مائية أخرى
فلا يقتصر وجود الخياشيم على الأسماك بل يوجد في بعض
السلمندرات وطور أبي ذنبية وهو طور من أطوار الضفادع .

. ماهى الثروة السمكية ؟ يقصد بالثروة السمكية بشكل رئيسي الأسماك وغيرها من الحيوانات اللافقارية المائية كالأصداف والمحارات والتي يطلق عليها بالأسماك الصدفية والقشريات. اما الحيوانات الثديية اتصفت بوجود الأتداء . ويمكن التمييز بينها وبين الأسماك بالنظر إلى الزعنفة الذيلية حيث أنها تمتد باتجاه محور الجسم في الأسماك وعرضياً مع امتداد محور الجسم في الثدييات .

لماذا صنفنا الأسماك مع الحبليات Chordata ؟

1- الحبل الظهري Notochord في الأطوار الجنينية

2- الحبل العصبي الظهري Dorsal Nerve Cord

3- اتجاه الدم في الأوعية الدموية الظهرية والبطنية

4- وجود الثقوب الخيشومية Gill-slits التي تتحول في

الأسماك العظمية إلى حجرتين خيشوميتين Gill-chambers

5- بوجود زعنفة ذيلية واضحة في معظم الأسماك تمثل منطقة

الذيل Tail-region في الثدييات .

أما ضمها إلى شعبة الفقاريات Vertebrata فقد كان مبنياً

على محور الحبل الظهري والذي يوجد في الأطوار الجنينية إلى

عمود فقري في الأطوار البالغة .

تعتبر الأسماك من أكثر الحيوانات الفقارية تنوعاً حيث وصل عدد أنواعها 33932 نوع من مجموعة أنواع الفقاريات بما فيها الأسماك والذي وصل إلى 41.600 نوع حسب الإحصائيات الحديثة من مجموع الفقاريات المعروفة .

أجمعت المراجع التصنيفية الحديثة على أن هذا التعريف ينطبق على خمسة

طوائف هي :

- 1 - طائفة الأسماك الصندوقية (الصدفية) Ostracoderms (منقرضة) .
- 2 - طائفة الأسماك المدرعة (صفائحية الجلد) Placoderms (منقرضة) .
- 3 - طائفة الأسماك عديمة الفكوك (Agnatha) Cylostomes (حية) .
- 4 - طائفة الأسماك الغضروفية Chondrichthyes (حية) .
- 5 - طائفة الأسماك العظمية Osteichthyes (حية) .

ويطلق على الأسماك الغضروفية والعظمية بذوات الفكوك Jawed fishes (Ganthostomata) أما مجموعة Acanthodian وضعها غير معروف

لماذا؟ وضعت الأسماك عديمة الفكوك مع الأسماك والتي وصل عدد أنواعها 50 نوعاً .
بسبب وجود الجمجمة - والخياشيم - والمعيشة في الماء - وجود الزعانف .

1- **عديمة الفكوك** هي أسماك اللامبري **Lamprey** وأسماك الجريث **Hagfishes** - تعتبر أقدم مجموعة فقارية تعيش حتى الآن .

2- **الأسماك الغضروفية** تراوحت أنواعها **555** نوعاً وشملت أسماك السّفن **Rays** والقوابع **Skates** والقروش **Sharks** وكذلك الأسماك الخرافية **Chimaeras** .

3 - **الاسماك العظمية** تشكل الغالبية العظمى من الأسماك فهي تتميز بوجود العظم - أعداد أنواعها **20 ألف نوع** . وتشمل الأسماك الرئوية **Lungfishes** التي سجلت منها **ستة** أنواع توجد في أفريقيا (4 أنواع) وأستراليا (نوع واحد) وأمريكا الجنوبية (نوع واحد) . بقية الاسماك العظمية .

ملاحظة تسمى أحياناً الأسماك الرئوية بالقمعية **Choanata** نظراً لامتلاكها **مناخير تفتح في البلعوم** .

البيئات التي تعيش فيها الأسماك

FISH HABITATS

الماء هو مسلك ووسط الترحال والمعيشة للأسماك فهو بيئتها في محياها وقبرها في مماتها .

ماهى العوامل التي تتاثر فيها؟. تتأثر الأسماك بالأكسجين بالضغط ، والأملاح المذابة ، والضوء ، والحرارة ، والمواد السامة ، والطفيليات

1- تنحصر بعض الأسماك في الماء العذب بحيث لا تستطيع تحمل الملوحة الزائدة وهى أسماك أولية **Primary Freshwater Fishes** مثل الشبوط.

2- الأسماك الأخرى التي تستطيع أن تنتقل بين الماء المالح والعذب فتسمى بالأسماك الثانوية **Secondary Freshwater Fishes** مثل سمك السلمون.

3- بقية الاسماك تعيش في الماء المالحة(البحار والمحيطات).

قليل من الأسماك الغضروفية التي تعيش في الماء العذب مثل سمكة *Pristis* التي تكثر في مياه الصين والهند وأمريكا الوسطى وقليل من عديمة الفكوك مثل اللامبري *Lamprey* الذي يعيش في الماء العذب والمالح في نصف الكرة الأرضية الشمالي حيث يعيش الطور اليرقي (يرقة الأموسيس *Ammocoetes*) في طمى مياه الأنهار وتتغذى على المواد العضوية مثل الطحالب وبعض الأوليات الحيوانية بينما تبقى الأطوار البالغة كطفيليات على أسماك المياه المالحة والعذبة . فشكلت مثلاً أسماك اللامبري مجاميع خاصة في البحيرات العظمى في أمريكا الشمالية

تصنيف الأسماك وصفاتها

الخارجية

1- الأسماك المنقرضة

2- الأسماك الحية

**الأسماك الصندوقية (درع-
لا توجد فكوك ولا زعانف
مزدوجة-الاردونيشي)**

**الأسماك المدرعة (صفائحية الجلد صفايح
عظمية-الديفوني -عصر الاسماك)
*Placoderms***

الاسماك عديمة الفكوك Agnatha

- 1- الجسم ثعباني الشكل
- 2- لاتوجد عظام اوفكوك
- 3 – لاتوجد زعانف مزدوجة
- 4 – لاتوجد حراشف
- 5 – قناة هلالية واحدة(الجريث)او قناتين(اللامبري)
- 6 – لاتوجد اقواس خيشومية
- 7 – لا يوجد غطاء خيشومي
- 8 – منخر واحد وسطي - الكيس الانفي مغلق(اللامبري) او مفتوح(الجريث)
- 9- لاتوجد مثانة عوم

Class:Agnatha

Subclass(1): Cephalospidomorphi

Order:

Petromyzontiformes(Lamprey)

Subclass(2):Pteraspidomorphi

Order:Myxiniiformeres(Hagfish)

. أسماك الجريث تختلف عن اللامبري في الخصائص التالية:

- 1 . وجود ملامس حول الخطم *Snout* .
- 2 . إختفاء الزعنفة الظهرية .
- 3 . الأعين مندثرة .
- 4 . فتحة المنخار في مقدمة البوز .
- 5 . يتراوح عد أزواج الجيوب الخيشومية من ست إلى خمسة عشر زوجاً .
- 6 . لا يوجد طور يرقي في الجريث لكن يرقة *Ammocoete* في اللامبري

الاسماك الغضروفية Chondrichthyes

- 1- حراشف مدرعة
- 2- زوجان من الزعانف الجانبية
- 3- الفكوك تتمفصل مع الجمجمة
- 4- تغطي الاسنان بالمنيا
- 5 – ثلاثة قنوات هلالية
- 6- زوجان من المناسل
- 7- عدم وجود مثانة العوم (تركز اليوريا في الدم TMAO+ لرفع الضغط الاسموزي)
- 8 – تلقيح داخلي
- 9 - غضاريف

Class: Chondrichthyes

Sub Class(1):Elasmobranchii

O.Lamniformes(Sharks)

O.Rajiformes(Skates&Rays)

Subclass(2):Holocephali

○ O.Chimaeriformes(Chimaeras)

الأسماك الغضروفية Chondrichthyes

shark القرش

skate القوبي

Ray السمك

الاختلافات الرئيسية بين طويئة مجموعة القروش والقوابع وطويئة الأسماك الخرافية

الخرافية (Chimaeras) Holocephali	القروش والسفن والقوابع Elasmobranchii
أربعة أزواج من الخياشيم مغطاة بغطاء لحمي (فتحة خيشومية واحدة) .	- خمسة إلى سبعة أزواج من الخياشيم والفتحات الخيشومية .
لا توجد فويهة spiracle .	- توجد فويهة spiracle .
لا توجد حراشف درعية .	- حراشف من النوع الدرعي placoid .
لا يوجد مذرق cloaca .	- يوجد مذرق cloaca .
لا توجد مقابض claspers .	- توجد مقابض claspers .
يوجد تركيب tenaculum في مقدمة الرأس .	- لا يوجد تركيب Tentaculum في مقدمة الرأس .

بمايتميز سمك القرش عن القوابع والسفن ؟

1- بوجود فتحات خيشومية جانبية بينما اللواسع والقوابع الفتحات سفلية .

2- يوصف ذيل أسماك القرش بأنه غير متجانس Heterocercal tail نظراً لعدم تساوي الجزأين العلوي والسفلي منه .

3- يوجد منخاران أسفل الرأس Nostrils

Ratfish with "spermatophore"
(sperm string) hanging out and
claspers visible

© 2009 F. Mierao

Osteichthyes الاسماك العظمية

- 1- اكثر تنوعا
- 2- هيكل عظمي
- 3 - غطاء خيشومي
- 4 - دعائم شعاعية واشواك
- 5 - حراشف دائرية او مشطية او كوزمية او جانودية
- 6 - في المياه المالحة والعذبة
- 7- وجود مثانة العوم او رئة
- 11 - الفك العلوي مكون من الفكي maxillary وقبل الفكي pr. maxillary

Osteichthyes (Bony fishes)

Super Order.Dipnoi

Order.Dipteriformes(lung fishes)

المثانة تحولت بما يشبه الرئة-انسجة خيشومية-بيات صيفي – تتنفس الهواء الجوي

Super order:Crossopterygii

O.Actinistia/Coelacanthiformes(Coelacanth)

زعانف لحمية مفصصة – اكتشفت 1938 حيث كانت تعتبر منقرضة في جزر كومورو

Sub class(2):Actinopterygii

Infraclass: Chondrostei:

O.polypteriformes(Bichirs)

O.Acipenceriformes(sturgeon/paddelfish)

Infraclass:Holostei 1

O.Semionotiformes(Gars)

O.Amiiformes(Bowfins)

- 1- ذيل متشابه الفصين خارجيا.2- لا توجد فويهة.3- الفكوك حرة الحركة نوعا ما.4- قليل من الحراشف الجانودية.3.

Sub class(2):Actinopterygii

Infraclass:Teleostei

Superorders:

1-Clupeomorpha(Herrings)

2-Elopomorpha(Tarpons/Eel)

3- Osteoglossomorpha(Bony tongue)

4-Protacanthopterygii(Trout-Lantern)

5-Ostariophysi(Catfish/minnows)

6-Paracanthopterygii(Cod/Angler fishes)

7-Acanthopterygii(Spino rayed fishes)

1- ذيل متجانس. 2- حراشف دائرية وعظمية. 3- تعظم واضح. 4-مثناة متطورة. 5- بروز عظمين فكي وقبل فكي. 6- الجسم اصغر- حركة

(COELACANTH, LATIMERIA) الشكل العام لسمكة فصية الزعانف

الأسماك العظمية *Osteichthyes*

الشكل العام لسماك عظمي من شبه الجزيرة العربية (*Cyprinion sp.*)

سمكة رئوية Lung Fish

وسمكة الحفش Sturgeon

أبو مجداف Paddle Fish

Gars أبو منقار

Bowfin البوفن

A photograph of a boat on a river during a misty sunset. The boat is in the foreground, silhouetted against the bright, hazy sky. The river is covered in a thick layer of mist that rises from the water. The sky is a mix of soft orange and grey tones. The boat has several vertical poles and a canopy structure. The overall mood is serene and atmospheric.

OCTOBER 3, 2012

FRASER RIVER, BRITISH COLUMBIA

carpandcatbussters
present

مضغوط الجانبيين
(I) Compressiform

مغزلي Fusiform

ثعباني Anguilliform
(الأنقليس)

مضغوط من أعلى إلى
أسفل (Depressiform)

Taeniform شريطي

Filiform خيطي

Globiform شبه كروي

Sagittiform سهمي

الفم والزعانف Fins :

قسمت زعانف الأسماك العظمية إلى:-

1-الزوجية هي الزعانف الصدرية Pectoral Fins

والحوضية Pelvic Fins

2-المنفرده هي الظهرية Dorsal Fins والشرجية Anal

Fins والذيلية Caudal Fins

3- تدعم هذه الزعانف بدعائم شعاعية تتحول في بعض

المجاميع السمكية إلى أشواك صلبة وحادة مثل ما يوجد من

أشواك في أسماك الهامور والصابي (السيجان) المنشرة في

مياه البحر الأحمر والخليج العربي

اشكال الزعنفة الذيلية في الأسماك العظمية

الشكل المقطوع Truncate

الشكل المدور Rounded

الشكل الهلاللي Lunate

الشكل المسنن Emarginate

أنواع الزعنفة الذيلية في الأسماك العظمية

الذيل غير متجانس مختصر
Abbreviate Heterocercal

الذيل غير متجانس
Heterocercal

الذيل المتساوي
Isocercal

الذيل المتجانس
Homocercal

تركيب الجلد ومشتقاته

قطاع في جلد الأسماك يوضح الطبقتين الرئيسيتين المكونتان له

تبيّن من خلال تشريح جلد الأسماك أنه يتكون بصفة عامة
من طبقتين هما :

البشرة Epidermis :

عشر إلى ثلاثين طبقة من الخلايا محاطة خارجياً بخلايا
حرفية بعض خلايا البشرة تحور إلى غدد مخاطية تفرز المخاط
الذي يشكل غلافاً خارجياً لجلد الأسماك حيث يتكون من بروتين
جلايكوپروتي **Glycoprotein**

الأدمة Dermis :

تتألف الأدمة من طبقة إسفنجية **Stratum Spongiosum**
تقع أسفل البشرة والطبقة العميقة المضغوطة **Stratum Compactum**
وتحتوي على أصباغ وأوعية دموية وأعصاب وعدسات مضيئة في بعض
الأسماك .

وظائف الجلد

- 1- الخلايا المخاطية-حماية من البكتيريا والطفيليات
- 2- المخاط يقلل الاحتكاك بالماء
- 3- يرسب المخاط الشوائب
- 4- يمنع المخاط اختناق الاسماك في المياه العكرة
- 5- تنظيم اسموزي
- 6- المخاط واصلاح الجروح
- 7- المخاط- بناء الاعشاش
- 8 - التنفس - تبقى الاسماك خارج الماء
- 9 -الغدد السامة للدفاع والهجوم
- 10- تحورات الى حراشف وغيرها للحماية
- 11- انتاج الضوء - Photophores- حاملات الضوء
- 12- مستقبل كيمياوي-براعم التذوق
- 13- انتاج Pheromones -انذار

الحراشف Scales :

يُغطي جسم معظم الأسماك بحراشف مختلفة الشكل وتنشأ من طبقة الأدمة ، غير أن بعض الأسماك لا تغطي أجسامها بقشور مثل أسماك القرموط **Catfishes** ، وقد تحورت القشور إلى تراكيب عظمية أخرى مثل الصفائح العظمية Bony Plates أو القشور **Scutus** في أسماك الحفش (Sturgeons) .

قسمت الحراشف حسب نشأتها إلى حراشف.

مدرعة **Placoid Scales** تكونت نتيجة لإفرازات من البشرة والأدمة.

والحراشف غير المدرعة والتي نشأت من الأدمة كالحراشف المشطية والدائرية والجانودية والكوزمية

أنواع حراشف الأسماك

(e) حرشفة درعية
.Placoid

(d) حرشفة
لامعة Cosmoid

(c) حرشفة
جانودية Ganoid

(a) حرشفة
دائرية
Cycloid
مشطية
Ctenoid(b)

وظائف الحراشف

- 1- حماية جسم الاسماك
- 2- تحور في القرش الى اسنان
- 3- تحور الى صفائح في الحفش
- 4 - شوك في الاسماك المنتفخة للحماية
- 5- اسنان خيشومية لتصفية العوالق
- 6- حلقات حصان البحر حول الجسم للحماية
- 7 - تصنيف الاسماك -انواع الحراشف
- 8 - تقدير عمر ونمو الاسماك
- 9- دليل على الاسماك المتحجرة.

الجهاز العضلي

MUSCULAR SYSTEM

تركيب العضلات Muscles Structure

يتكون الجهاز العضلي في الأسماك من قطع عضلية
قسمت تركيباً إلى ثلاثة أنواع هي :

(1) العضلات غير المخططة (الملساء) Smooth
Muscles

(2) العضلات القلبية Cardiac Muscles

(3) العضلات الهيكلية المخططة Striated Skeletal
Muscles

- ووظيفياً يمكن تقسيمها إلى :-
- 1- إرادية Voluntary أو المخططة.
 - 2- وغير إرادية أو غير المخططة Involuntary

**ترتيب العضلات الجانبية
في الأسماك**

حركة الاسماك

- تبادل الانقباض والانبساط في العضلات (تموجات طولية)
- حركة الزعانف (الرأس الزعنفة الذيلية والسويقة الذيلية - الصدرية لتغير الاتجاه - الظهرية للتوازن وكذلك الشرجية)
- خروج الماء من الفتحات الخيشومية
- تحافظ اسماك القرش على وضعها بحركة دائمة بمساعدة الزعنفة الذيلية والصدرية ورأسه العريض ودهن السكوالين
- الاسماك الطيارة لها زعانف على هيئة اجنحة
- حصان البحر يسبح في وضع راسي
- الاسماك الشراعية تقوم بالوثب
- مثانة الغاز تحافظ على وضع الاسماك العظمية في عمود الماء

الجهاز الهضمي

DIGESTIVE SYSTEM

يتكون الجهاز الهضمي في اللامبري **Lamprey** من:-

- قمع فمي **Buccal Funnel** .
- أسنان قرنية

- التجويف الفمي **Buccal Cavity**

- لسان **Tongue** قابل للاندلاع ويحمل كذلك أسنان قرنية .

- التجويف الفمي البلعومي - المريء **Esophagus**

- الأمعاء الأكثر اتساعاً **Anal Opening - Intestine** الواقعة عند قاعدة

الزعنفة الذيلية ولا توجد معدة في أسماك اللامبري وكذلك أسماك الجريث جدار

امعاء الامبري رفيع لانه يتغذى على سوائل ودم الفريسة- الجريث لها جدار سميك وتكشط فريستها.

- (١) القمع الفمي Buccal funnel
 (٢) الفم Mouth
 (٣) اللسان Tongue
 (٤) التجويف الفمي Buccal cavity
 (٥) المريء Oesophagus
 (٦) النقباب Velum
 (٧) المزدرد Gullet
 (٨) الأمعاء Intestine
 (٩) الكبد Liver

الشكل (١٧-١). تركيب الجهاز الهضمي في اللامبري Lamprey

(المصدر: Juntunen et al., 1973)

الجهاز الهضمي في سمك كلب البحر Dogfish يتكون من التجويف الفمي
Buccal Cavity - فتحة الفم Mouth - البلعوم Pharynx - المعدة
Intestine امعاء بها SPIRAL VALVE - المخرج cloaca

يلحق بقناة الهضم لكلب البحر الكبد liver والبنكرياس pancreas والطحال spleen
الطحال بني اللون ويتصل بالمعدة أدرج الطحال مع الجهاز الهضمي نظراً لاتصاله
بالمعدة فقط حيث أن وظيفته ليست هضمية

- (١) الفص الأيسر للكبد Liver's left lobe
 (٢) الحوصلة الصفراوية Gall bladder
 (٣) الفص الأوسط للكبد Liver's middle lobe
 (٤) الفص الأيمن للكبد Liver's right lobe
 (٥) المعدة Stomach
 (٦) البنكرياس البطني Ventral pancreas
 (٧) الطحال Spleen
 (٨) البنكرياس الظهري Dorsal pancreas
 (٩) الصمام الحلزوني Spiral valve
 (١٠) غدة المستقيم Rectal gland
 (١١) ثقب بطني Abdominal pore
 (١٢) النجم Cloaca

الشكل (٧-٢). تركيب الجهاز الهضمي في القرش Shark

(المصدر : Juntunen et al., 1973)

يتكون الجهاز الهضمي في الأسماك العظمية من القناة الهضمية Alimentary canal وملحقاتها وهي الكبد Liver البنكرياس Pancreas حيث لا توجد غدد لعابية . وتختلف احتياجات الأسماك الغذائية فمنها الأسماك آكلات الأعشاب Herbivores وأكلات اللحوم Carnivores ومتنوعة الغذاء Omnivores ومصفيات العوالق خاصة صغار الأسماك Filters Feeders. تكيفات مع طبيعة غذائها كالتغيرات والتحورات في تركيب وشكل الجسم Body Shape والفم Mouth ونوع وشكل الأسنان Teeth والأسنان البلعومية Pharyngeal Teeth والأسنان الخيشومية Gill Rakers وكذلك شكل وتركيب القناة الهضمية Alimentary Canal

مواقع فم الاسماك .

طرفي **Termial** في الشبوط ويتميز بتساوي طولي الفكين الفك العلوي Upper Jaw والفك السفلي Lower Jaw وبالتالي تستطيع الأسماك تناول غذائها من وسط عمود الماء .. يوجد موقع آخر للفم بحيث يزيد طول الفك العلوي قليلاً على الفك السفلي ليكون الفم شبه طرفي **Subterminal Mouth** في التروت والفم السفلي **mouth Inferior** في القوابع والفم العلوي **Superior mouth** في الحرسون

C TERMINAL

D SUPERIOR

FIGURE 2-2

Examples of mouth positions in fishes. **A**, Inferior (sturgeon); **B**, subterminal (dace); **C**, terminal (trout); **D**, superior (sandfish). (**D** based on Jordan and Evermann, 1900.)

فم متزقة الفم
Slip mouth

فم سمكة البيغاء
Parrot fish

فم عروس البحر (الفراشة)
Butterflyfish

نماذج للأفواه المتحركة في بعض الأسماك العظمية

الفك السفلي Lower Jaw

الفك العلوي Upper Jaw

الأسنان على فكوك بعض الأسماك العظمية

- ١ - خيوط غلصية (خيشومية) Gill filaments .
 ٢ - قوس غلصي Gill arch .
 ٣ - أسنان غلصية Gill rakers .

الأسنان الخيشومية في سمك عظمي

- . Fin chopper قاذمة الزعنفه
- . Zooplankton feeders مغتذيات العوالق الحيوانية
- . Rock scrapers كاشطات الصخر
- . Hunters الصيادات
- . Plant scrapers كاشطات النبات
- . Leaf chopper قاذمة الأوراق
- . Employers of subterfuge المخادعات
- . Generalised ancestor (السلف) (الاسلاف)

- . Mollusc crushers طاحنات الصدق
- . Digger الحفار
- . Picker الملاقط
- . Arthropod eaters آكلات المفصليات
- . Piscivores آكلات الأسماك
- . Eye biter ناقرة العين
- . Scale eaters آكلات الحراشف
- . Mimic الخماكي

الأسنان البلعومية في سمك عظمي

العلاقة بين الأسنان الفكية والبلعومية
والغذاء في أسماك البلطي
في بحيرة ملاوي

المتطلبات الغذائية والهضم

DIGESTION AND NUTRITIONAL REQUIREMENTS

أنماط للتغذية (حصولها على الغذاء) في الأسماك هي:

1. الامتصاص **Inertial Sucking** :

تستخدم الأسماك هذه الطريقة للحصول على الغذاء في أحد أطوار حياتها ويجب أن تمتص الأسماك غذائها مع الماء بفعل زيادة حجم التجويف الفمي عندما يكون الفم مفتوحاً .

2. الالتهام **Ram-Feeding** :

وبهذه الطريقة تسبح الأسماك باتجاه المادة الغذائية وهي فاتحة أفواها أثناء السباحة وتلتهم المادة الغذائية بسهولة .

3. الاغتذاء الميكانيكي **Manipulation** :

وبهذه الطريقة تحصل الأسماك على غذائها بالعض **Biting** أو الكشط **Scraping** أو الرشف **Rasping** أو القبض **Gripping** أو الغمس **Dipping** الوصول إليها.

الهضم؟ البناء؟ الهدم؟

السلوك الاغذائي: - إما تكون (1) إجبارية التغذية أو (2) اختيارية الغذاء (3) عرضياً .

وتختلف الأسماك الصغيرة في متطلباتها الغذائية عن الكبيرة فمثلاً في صغار أسماك البلطي النيلي حيوانية التغذية تعتمد في غذائها على العوالق الحيوانية بينما الأسماك البالغة نباتية التغذية تعتمد على العوالق النباتية وقد يدخل في غذائها بعض النباتات المائية الكبيرة .

تعتبر معظم الأسماك انتقائية التغذية Selective تتعرف على المواد الغذائية من خلال حواسها كالعين وأعضاء الشم وأعضاء الخط الجانبي والحواس الكهربائية وبراعم التذوق . ويمكن التعرف على مدى انتقاء الأسماك لغذائها بعدة طرق من أهمها استخدام المعادلة التالية التي اقترحها Ivelvis في عام 1961 م :

$$E = \frac{r_i - p_i}{r_i + p_i}$$

مثال :

إذا كانت نسبة اليوجلينا في الوسط البيئي (pi) = 0.36 ونسبتها في معدة البلطي النيلي (ri) 1.15 احسب معامل الإنتقاء الغذائي (E) لهذا الكائن وفسر النتيجة؟

الحل :

$$E = \frac{1.15 - 0.36}{1.15 + 0.36} = \frac{0.79}{1.51} = 0.52$$

حيث (E) تمثل دليل الانتقاء و (ri) تمثل نسبة المادة الغذائية في قناة الأسماك الهضمية و (Pi) تمثل نسبة المادة الغذائية في الوسط البيئي التي جمعت منه الأسماك . وتراوح قيمة الدليل الانتقائي بين (1-) و (1+) حيث (1-) تدل على أن الأسماك لا تفضل الإغذاء على هذا النوع من الغذاء بينما (1+) تدل على أن المادة الغذائية مفضلة بدرجة عالية و (0) تدل على تساوي وجود المادة الغذائية في معدة الأسماك ووسطها البيئي ولا تبدي بذلك الأسماك أي تفضيل نحو المادة الغذائية .

تتطلب الأسماك كغيرها من الحيوانات البروتينات Proteins والمواد النشوية)
كربوهيدرات Carbohydrates والدهون Fats والمعادن Minerals والماء . .
وتتأثر العمليات الأيضية في الأسماك مباشرة بدرجات الحرارة لأنها تغير درجة حرارتها
حسب الوسط الذي تعيش فيه .

الكربوهيدرات	<u>Carbohydrases</u>	ثنائي السكر	احادي السكر
البروتينات	Proteases	ثنائي الببتيد	حمض اميني
دهن	Lipases	دهن مستحلب	حمض دهني وجلسرين

ملاحظة

- 1- المفترسات تحتاج بروتين اكثر وكذلك الصغيرة واسماك البحار
- 2- يجب توفر 10 احماض امينية
- 3- تخزين النشويات على هيئة نشا حيواني
- 4-- المخاط يحمي ويسهل البلعة والمعدة تفرز حمض والببسين في الامعاء تفرز العصارات المعوية ومحللات الدهون

النمو وتقدير العمر

AGE AND GROWTH

تقدير العمر :

نظراً للارتباط الوثيق بين الزيادة في طول الأسماك ووزنها وعمرها فيقدر العمر بعد الحلقات المتكونة في الفقرات أو الحراشف (الحساب التراجعي) أو الأشواك أو حسب طريقة التذبذب في الطول وهي الطريقة المعروفة بطريقة (Peterson).

Otolith from an age-5 white crapple, Kentucky Lake, TN

4th Annulus →

3rd Annulus →

2nd Annulus →

1st Annulus →

Focus →

هل يستمر نمو الأسماك طوال فترة حياتها؟
تعتبر دراسة النمو من الدراسات البيولوجية الهامة لكونها دليل واضح على ما تتمتع به المجموعة السمكية من صحة ونشاط . فالنمو السريع مثلاً يقترن بوفرة الغذاء بينما يتباطأ معدله عند عدم توفر الظروف المناسبة له . ويزيد معدل النمو في المواسم الدافئة عنه في الباردة وبذلك يمكن تعريفه بأنه التغير في الطول أو الوزن في وقت معلوم أو بأنه التغير في السرعات الحرارية المخزونة بالأنسجة الجسدية والتناسلية

ويتحكم في النمو:-

- 1-هرمونات الغدة النخامية.
- 2-التفاوت في درجات الحرارة والأكسجين المذاب والأمونيا والملوحة وشدة
- 3-توفر المصدر الغذائي
- 4-والمنافسة الفردية أو الجماعية
- 5- ومعدل الإضاءة.

طرق تتبع التغيرات في نمو الطول والوزن إحدى الطرق التالية :

1. الطريقة المباشرة Direct Method

وتعتمد هذه الطريقة على معرفة الطول أو الوزن للسمكة ومن ثم حساب التغير الذي حدث في أوزان وأطوال معروفة عند تربيتها في أحواض مائية مناسبة ومتابعتها بعد فقس البيض حتى نهاية فترة النمو حيث يمكن معرفة معدل الزيادة أو النقص في الطول أو الوزن .

2. طريقة التعليم Mark & Recapture Method

تعتمد هذه الطريقة على حساب الطول أو الوزن بعد صيد مجموعة من الأسماك ومن ثم تعليمها بعلم مناسب وإطلاقها في الوسط المائي مرة أخرى ومن ثم صيدها مرة أخرى بعد فترة مناسبة من الزمن ، ويحسب بعد ذلك الوزن والطول ومن ثم تحسب الزيادة في الوزن أو الطول أي معدل النمو خلال فترة زمنية محددة.

3. طريقة التذبذب في الطول Length-frequency (طريقة Petersen) .

يمكن تتبع معدل النمو من معرفة أطوال المجاميع السمكية بعد صيدها ومن ثم تمثيل ذلك في علاقة بيانية بين طول المجموعات الطولية وعدد الأسماك أو نسبتها . قمم المنحنيات التي في الشكل وتبرز الفئات العمرية المختلفة للأسماك ويمكن تقدير الأعمار للمجموعات الطولية حسب عدد القمم

وتكمن أهمية وفرة الغذاء في التأثير على معدل النمو في صغار الأسماك حيث أنها تنمو بسرعة أكبر مما تنموه الكبار نظراً لما يصرف من الطاقة في تكوين الأنسجة الجسدية فقط ، أما في الأسماك اليافعة فإن ما يصرف من الطاقة لا يقتصر على تكوين الأنسجة الجسدية فقط بل يتعدى ذلك إلى تكوين الأنسجة التناسلية .

ويعكس التغير في معامل حالة الأسماك (K) نموها حيث أنه يدل على صحتها ومناسبة بيئتها ، ويقاس هذا العامل من المعادلة التالية التي ذكرها Bagenal & Tesch في عام 1978م :

$$K = \frac{W}{L^3} \times 100$$

فإذا كان وزن سمكة معينة 8 جرام يكون معامل حالتها 0.8 عندما يكون طولها 10 سم . حيث $W =$ وزن السمكة بالأحشاء أو بدون الأحشاء بالجرام و $L =$ طول السمكة بالسنتيمتر . وتدل قيمة هذا المعامل على صحة الأسماك ومدى إمكانية تسويقها ويدل كذلك بطريقة غير مباشرة على مدى توفر المادة الغذائية الضرورية لنمو كلا النوعين من الأنسجة الجسدية والتناسلية وموسم التكاثر

4 . طريقة الحساب التراجعي Back-Calculation

.

تعتمد على حساب طول الأسماك في السنوات الماضية من العمر باستخدام المعادلة التالية :

$$L_n = \frac{S_n}{s} \times L$$

إذا كانت العلاقة بين طول السمكة ونصف قطر الحرشفة خطية ويمر المستقيم في نقطة الأصل ، أما إذا كان المستقيم في هذه العلاقة لا يمر في نقطة الأصل نستخدم المعادلة المطورة التالية :

$$L_n = \frac{S_n}{s}(L - a) + a$$

حيث أن :

الطول الفعلي للسمكة وقت الصيد (الطول الملاحظ) .	=	L
الطول الكلي عند عمر (n) وهو المراد معرفته .	=	L_n
نصف قطر القشرة عند عمر (n) .	=	S_n
نصف قطر القشرة الكلي وقت الصيد (القطر الملاحظ) .	=	s
(a) = ثابت يوجد من معادلة الانحدار الخطي		

4th Annulus →

3rd Annulus →

2nd Annulus →

1st Annulus →

Focus →

معادلات النمو في الاسماك:

1. معدل الاعلاف المتناولة كنسبة يومية من وزن الجسم = 3% من الوزن الكلي للأسماك الكبيرة (يختلف المعدل حسب عمر الاسماك حيث تقل النسبة كلما كبرت الاسماك وتزداد في الاسماك الصغيرة حتى تصل النسبة الى 20% في الاسماك حديثة الولادة وتحدد الكمية بنسبة مئوية لان العلف الزائد عن الحاجة يؤدي الى خسارة مادية والى تلف خصائص المياه للأسماك)
2. معدل البروتين المتناول = وزن الغذاء المتناول × النسبة المئوية للبروتين في الغذاء (وهو عبارة عن النسبة المئوية للبروتين المتناول الموجودة في العلف المتناول خلال التجربة لان البروتين هو اهم المكونات الغذائية في الاعلاف)
3. الوزن المكتسب = الوزن النهائي (بالجرام) - الوزن الابتدائي (بالجرام) (هو عبارة عن الزيادة في وزن الاسماك خلال فترة التجربة ويستخدم هذا القياس في المقارنة بين المعاملات المختلفة وكلما ارتفعت قيمة القراءة كلما كانت المعاملة المستخدمة افضل)
4. النسبة المئوية للوزن المكتسب (بالجرام) = $\frac{\text{الوزن النهائي} - \text{الوزن الابتدائي}}{\text{الوزن الابتدائي}} \times 100$ (بالجرام) × 100 (هو عبارة عن النسبة المئوية للزيادة في الوزن مقارنة بالوزن الابتدائي خلال فترة التجربة وهو ايضا يصلح للمقارنة بين المعاملات المختلفة اثناء التجربة)
5. معدل النمو النوعي = $\frac{\text{الوزن النهائي للأسماك} - \text{الوزن الابتدائي للأسماك}}{\text{الفترة الزمنية بالايام}} \times 100$ (بالجرام) × 100 (وهو عبارة عن النسبة المئوية للزيادة اليومية في وزن الاسماك خلال فترة التجربة وهو ايضا يستخدم للمقارنة بين المعاملات المختلفة اثناء التجربة)
6. معدل النمو النوعي اللوغاريتمي = اللوغاريتم الطبيعي للوزن النهائي Ln wf - اللوغاريتم الطبيعي للوزن الابتدائي Ln wi × 100 (المدة الزمنية للتجربة (T₂-T₁)) (هو عبارة عن النسبة المئوية للنمو اليومي للأسماك معبر عنه باللوغاريتم الطبيعي وهو ايضا كما في المعادلة السابقة)
7. معامل تحويل الغذاء = $\frac{\text{الوزن الجاف للغذاء المستهلك}}{\text{الوزن الحي المكتسب}} \times 100$ (بالجرام) (يعني كم جراما من العلف تكفي لحدوث زيادة في وزن الاسماك بمقدار جرام واحد. أي ان المعدل 1:1 يعتبر من اعلى معدلات الغذاء . اما 3 : 1 أو أكثر فيعتبر الغذاء فقيرا)
8. معدل كفاءة الدهون = $\frac{\text{اجمالي الوزن المكتسب}}{\text{اجمالي الدهون التي تم تناولها}} \times 100$ (بالجرام) (وهو عبارة عن النسبة بين الوزن المكتسب خلال فترة التجربة وبين الوزن المتناول من الدهون لمعرفة دور الدهون في زيادة الوزن . وهو مقياس يستخدم لمقارنة الاعلاف المستخدمة في التجربة حسب احتوائها على الدهون . فكلما ارتفعت قيمة القراءة كلما كانت الدهون اجود)
9. معدل كفاءة البروتين = $\frac{\text{اجمالي الوزن الحي المكتسب}}{\text{اجمالي وزن البروتين المستهلك}} \times 100$ (بالجرام) (وهو عبارة عن نسبة الوزن المكتسب الى وزن البروتين العلفي المستهلك خلال فترة التجربة ويستخدم لمعرفة دور البروتين في زيادة الوزن وهو مقياس يستخدم للمقارنة بين مختلف الاعلاف في التجربة وكلما ارتفعت قيمة القراءة ارتفعت جودة البروتين)

10. كفاءة تحويل الغذاء = $\frac{\text{وزن الأسماك (بالجرام)}}{\text{وزن الغذاء المستهلك (بالجرام)}}$
(وهو عبارة عن نسبة الوزن المكتسب الى وزن الغذاء المستهلك وهو مقياس يستخدم لمعرفة جودة الأعلاف المستخدمة وكلما ارتفعت قيمة القراءة كلما كانت الإعلاب أكثر جودة)

11. معامل الكبد = $\frac{\text{وزن الكبد (بالجرام)}}{\text{وزن السمكة (بالجرام)}} \times 100$
(عبارة عن النسبة المئوية لوزن الكبد الى وزن السمكة ويستخدم للمقارنة بين الظروف البيئية المختلفة وكلما كانت القراءة أكبر كلما كانت الظروف أفضل)

12. معامل الأحشاء = $\frac{\text{وزن الأحشاء (بالجرام)}}{\text{وزن السمكة (بالجرام)}} \times 100$
(عبارة عن النسبة المئوية لوزن الأحشاء الى وزن السمكة ويستخدم للمقارنة بين الظروف البيئية المختلفة وكلما كانت القراءة أكبر كلما كانت الظروف أفضل)

13. معامل الحالة = $\frac{\text{وزن السمكة (بالجرام) (g)}}{\text{مكعب الطول الكلي للسمكة (بالسنتمتر) (cm) L}} \times 100$
(عبارة عن علاقة بين طول السمكة ووزنها ويستخدم للمقارنة بين المسملات أو الظروف البيئية المختلفة وكلما كانت القراءة أكبر كانت الظروف أفضل. فإن الظروف الجيدة تعطي قراءة تكون أكبر من الرقم 1 والظروف السيئة تعطي قراءة أقل من الرقم 1)

14. علاقات الطول بالوزن $W = aL^b$ (يحدد نوع العلاقة بين الطول والوزن)
الوزن الكلي (بالجرام) W (g)
الطول الكلي (بالسنتمتر) L (cm)
تأبث يمكن إيجادها باستخدام معادلة الانحدار الخطي. a , b

يمكن التعبير عن علاقة الطول بالوزن لوهرتميا كما يلي:

$$\text{Log } W = a + b \cdot \text{Log } L$$

حيث أن: W تعنى الوزن بالجرام و L تعنى الطول بالسنتيمتر.

(وهو مقياس يستخدم لمعرفة نوع العلاقة بين معياري الطول والوزن وتستخدم هذه العلاقة بين في دراسة النمو بحيث يمكن قياس احد المعيارين واستنباط المعيار الأخر من نتيجة الأول)

الجهاز الدوري

CIRCULATORY SYSTEM

يتركب دم الأسماك Fish Blood Structure من بلازما (Plasma) وكرات دم حمراء (RBC=Erythrocytes) وبيضاء (leukocytes=WBC) وصفائح دموية (Thrombocytes)

توجد ثلاثة قلوب في سمكة الجريث بالإضافة إلى القلب الخيشومي الرئيسي لتساعده في إتمام الدورة الدموية . هذه القلوب هي القلب الرئيسي في منطقة الرأس حيث يضخ الدم الوريدي إلى القلب الخيشومي ، ويضخ كذلك الدم الوريدي إلى القلب الذيلي . بينما يضخ القلب البوابي الدم عبر الكبد

Hagfish

**The heart of
a teleost fish.**

Blood Circulation

Heart

أهمية دم الأسماك

1- نقل الأكسجين

2- الغذاء والمواد المخزونة بين الأعضاء المختلفة .

3- ينقل الدم مختلف الهرمونات من الغدد التي تفرزها إلى أماكن نشاطاتها المختلفة في الجسم .

4- يقوم الدم بطرْد المواد الزائدة عن حاجة الأسماك إلى خارج أجسامها بواسطة أعضاء الإخراج .

5- يلعب الدم دوراً بارزاً في إصلاح جروح الأسماك بواسطة نقل المواد الخاصة بالتجلط

الجهاز التنفسي

RESPIRATORY SYSTEM

Diagrammatic Representation of Two Forms of Fish Gills

A Diagram of a section through a Fish's Gill

(ب) الجريت

- . 2 . برقع Velum
- . 4 . فتحة خيشومية Gill opening
- . 6 . حجرة خيشومية Gill chamber
- . 8 . قلب Heart

(أ) اللامبري

- . 1 . فتحة الفم Oral opening
- . 3 . أنبوية تنفسية Respiratory tube
- . 5 . نسيج خيشومي Gill tissue
- . 7 . أبهر بطني Ventral aorta
- . 9 . بلعوم Pharynx

شكل ترتيب الخياشيم

سمك عظمي

- . 2 . قوس خيشومي Gill arch
- . 4 . حاجز خيشومي Gill septum
- . 6 . شق خيشومي Gill slits

القرش

- . 1 . فويهة Spiracle
- . 3 . غطاء خيشومي Operculum
- . 5 . خيط خيشومي Gill filament
- . 7 . فتحة خيشومية Gill opening

ترتيب الخياشيم في الأسماك الغضروفية (القرش) والأسماك العظمية

الشكل العام للخيشوم الكاذب لسماك التروت Trout

- 1 - حاجز خيشومي . septum
- 2 Gill . شريان خيشومي وارد . Afferent branchial artery.
- 3 - سن خيشومي . raker
- 4 Gill - خيط خيشومي . filament
- 5 . شريان خيشومي صادر Efferent branchial artery

نماذج مختلفة للحواجز الخيشومية المختزلة في الأسماك العظمية والغضروفية

تيار الماء من تجويف الفم

إلى تجويف الغطاء الخيشومي

- . 2 . فجوات صفائحية Lamellar Lacunae
- . 4 . خلايا قائمة Pilstar Cells
- . 6 . جيب مركزي Central Sinus

شكل يوضح ظاهرة التيار المتعاكس Counter Current

A Diagram of a section through a Fish Gill Lamellae

Red arrows indicate the direction of blood flow and blue arrows indicate the direction of water flow.

- . 1 . شريان صادر Efferent Artery
- . 3 . قناة حافية Marginal Canal
- . 5 . شريان وارد Afferent Artery
- . 7 . فتحة خيشومية Gill Opening

الجهاز البولي التناسلي

URINOGENITAL SYSTEM

تتنوع تراكيب الكلية في بقية الأسماك العظمية ، مما أدى إلى اقتراح Ogawa في عام 1961م تصنيف كلى الأسماك العظمية في البيئات البحرية إلى الأنواع التالية حسب اتحاد الكليتين :

- 1 . التحام كامل للكليتين بحيث لا يمكن تمييز الكلية الرأسية Head Kidney من الجذعية Trunk Kidney كما في عائلة الساردين Clupeidae .
 - 2 . تلتحم الكليتان في وسطهما وطرفيهما الخلفيين ولكن يمكن تمييز الكلية الرأسية من الجذعية كما في عائلتي Plotosidae و Anguillidae .
 - 3 . تلتحم الكليتان في نصفيهما الخلفيين ويمكن تمييز الكلية الرأسية من الجذعية بوضوح كما هو موجود في الأسماك التابعة لأسماك البوري Mugilidae ومعظم الأسماك العظمية .
 - 4 . تلتحم الكليتان في أقصى الناحية الخلفية ولكن لا يمكن تمييز الكلية الرأسية من الجذعية كما في أفراد عائلة أسماك حصان البحر Sea Horse Syngnathidae .
- 5-انفصال تام بين الكليتين ويصعب تمييز الكلية الرأسية من الجذعية كما في أفراد عائلة Lophiidae

النوع الثالث

النوع الثاني

النوع الأول

أنواع الكلى في الأسماك العظمية

النوع الخامس

النوع الرابع

(ب)

(أ)

(د)

(ج)

F.G.P.= Femal genital pore

ثقب تناسلي
أنثوي

AN = الشرج
Anus

MES. D.= Mesonephric duct

قناة ميزنفرية

HK= كلية رأسية
Head
Kidne
y

SP. D. = Sperm duct

قناة منوية

R = Rectum مستقيم

UB = Urinary bladder

مثانة بولية

TK = كلية جذعية

Trunk
Kidney

UGD.= Urinogenital duct

قناة بولية
تناسلية

UGP. = ثقب بولي
Urinogenit
al pore

الجهاز البولي التناسلي لبعض الأسماك .

(ب) أنثى Cirrhina

(أ) ذكر Cirrhina

(د) ذكر Barbus

(ج) ذكر Labeo

شكل تخطيطي للوحدات الكلوية في الأسماك

(ب) وحدة لاكبية

٢ — عنق Neck

٤ — قطعة متوسطة Intermediat segment

٦ — أنيبب جامع Collecting tubule

(أ) وحدة لاكبية

١ — كرية كلوية Renal capsule

٣ — قطعة قريبة Proximal segment

٥ — قطعة بعيدة Distal segment

الجهاز البولي التناسلي لذكر وأنثى أسماك البلطي

مجري الميزونفروس المشترك

common

mesonephric duct

الكليتان

2 kidneys

مجري الميزونفروس
mesonephric duct

الخصيتان
testes

المثانة البولية
Urinary bladder

الوعاء الناقل
Vas deferens

الفتحة المشتركة
البولية التناسلية

الكليتان
2 kidneys

مجري الميزونفروس
mesonephric duct

Blood vessels
أوعية دموية
المثانة البولية

المبيضان
Ovaries

مجري الميزونفروس
المشترك

التكاثر والخصوبة

REPRODUCTION AND FECUNDITY

الأسماك إما أن تكون :-

1- بيوضة (Oviparous)

2- بيوضة ولودة (Ovoviviparous)

3- ولودة (Viviparous)

- 1 - درجة حرارة مناسبة لتتم عملية خروج الاصبغيات دون أضرار أو موت البيض المخصب .
- 2 - محافظة الأم على تهوية مناسبة .
- 3- المحافظة على وقت تزاوج مناسب.
- 4 - توفر مكان مناسب لوضع البيض يحميه من الأعداء ، للاختباء والتمويه ، في النباتات المائية.

تكاثر الأسماك بثلاث أنماط من التكاثر :

1 . التكاثر الجنسي Bisexual Reproduction :

- تكون الأجناس في هذا النمط من التكاثر منفصلة .
- ويتم نضج المناسل في كل من الذكور والإناث كل لوحدها .
- وهذا النوع من التكاثر هو الأكثر شيوعاً من بين الأسماك .
- ويتم تلقيح البيوض إما خارجياً أو داخلياً .

2 - التكاثر الخنثوي Hermaphroditic Reproduction :

تحمل السمكة في هذا النوع من التكاثر في أحشائها الخصى Testes والمبايض

Ovaries

. وقد تتبادل الخصى والمبايض النمو بحيث تنضج المبايض عندما تبلغ الأسماك طول معين تضمر بعدها إحداها للتتيح النمو للأخرى عندما تزداد السمكة طولاً كما يحدث في أسماك الهامور

. ويكون التلقيح خلطياً بحيث تلقح الحيوانات المنوية (الحيامن) البيوض لسمكة أخرى . ولا يحدث العكس بين السمكتين في نفس الوقت نظراً لتفاوت فترة نضوج المناسل في السمكتين

. وقد يكون التلقيح ذاتياً Self-fertilization بحيث تلقح الحيوانات المنوية البيوض أثناء وضعه .

3 . التكاثر البكري *Gynogenesis* :

- لا تلقح الذكور الإناث في هذا النوع من التكاثر وتكون الذرية الناتجة إناثاً كما يحدث في بعض أنواع *Poacilia*
- تختلف عدد البيوضات التي تضعها كل سمكة فيمكن لسمكة *Mola Mola* أن تضع أكثر من 28 مليون بيضة في الموسم الواحد
- ويعتمد عدد البيوضات كذلك على نوع السمكة وحجمها ونشاطها ووسطها البيئي

(أ) طافي

(ب) غاطس

نموذجان من بيض الأسماك

الخصوبة Fecundity

. الخصوبة المطلقة Absolute Fecundity وهي عبارة عن عدد البويضات في المبيض المتوقع وضعها في سنة واحدة .

خصوبة النسبية Relative Fecundity عندما ينسب عدد البويضات لوحدة الوزن أو الطول الخصوبة مؤشر لخصوبة الفرد وكذلك للمقارنة بين خصوبة الإناث في جماعة (عشيرة) محددة من الأسماك .

. الخصوبة النوعية (Specific Fecundity) ما تنجه الأنثى من الأسماك طول فترة حياتها ب. وتقدر الخصوبة المطلقة (الكلية) بالمعادلة التي استخدمها Martiez & Haude (1975) .:

$$\text{الخصوبة المطلقة} = \frac{\text{متوسط عدد البويضات في العينات}}{\text{متوسط وزن العينات}} \times \text{وزن المبيض}$$

النسبة بين الجنسين = (عدد الذكور او الاناث ÷ مجموع عدد الذكور والاناث) × 100
الخصوبة النسبية = الخصوبة المطلقة ÷ الطول الكلي او الوزن
معامل المنسل = (وزن المبيض بالجرام ÷ وزن السمكة بدون احشاء) × 100
معامل الامتلاء = (وزن القناة الهضمية بالجرام ÷ وزن السمكة بالجرام) × 100
معامل الكبد = (وزن الكبد بالجرام ÷ وزن السمكة بدون احشاء بالجرام) × 100

ويقدر مدى النضوج الجنسي للأسماك من تتبع مراحل النضج الجنسي حسب التقويم الذي ذكره Munro في عام 1979م وكذلك Thompson وmunro في عام 1978م والذي اعتمدت عليه معظم البحوث العلمية الخاصة بدراسة بيولوجيا التكاثر في الأسماك حيث تم تقسيم المراحل إلى ثمان مراحل على النحو التالي :

- 1 - **مرحلة السكون (Stage I (Immature)) :**
المناسل صغيرة جداً وشفافة ولم تتعرض لنمو البيض ويمكن التمييز بين المبيض والخصية .
- 2 - **المرحلة غير النشطة ((Stage I (Inactive)) :**
المناسل أكبر حجماً من المرحلة السابقة وشفافة . عادة الخصى أصغر حجماً من المبايض .
- 3 - **مرحلة بداية النضوج (Stage II (Maturing Or Recovering Spent)) :**
المناسل كبيرة ولكنها شبه معتمة . لا توجد حيوانات منوية . بعض البيض صغير في المبيض .
- 4 - **مرحلة النشاط والنمو (Stage III (Active Or Developing)) :**
حجم المناسل كبير والخصى معتمة ولكن بدون حيوانات منوية . المبايض ما تزال شبه شفافة وتحتوي على بيض ظاهر للعيان عند فحص المبيض .
- 5 - **مرحلة النضوج (Stage IV (Developed)) :**
الخصى ذات لون أبيض وتظهر بعض الحيوانات المنوية عند قطع الخصى من المنتصف . المبيض غير شفاف ومتماسك ويكون واضح البيض وعدده كثير لكنه غير شفاف .
- 6 - **المرحلة المثقلة (Stage V (Gravid)) :**
المبايض كبير الحجم وتملأ التجويف البطني والخصى شفافة يخرج منها سائل منوي (Milt) عند عصرها أو قطعها .
- 7 - **مرحلة الإلقاء (Stage VI (Spawning)) :**
المبايض والخصى كبيرة الحجم ويخرج البيض والحيوانات المنوية عند الضغط على منطقة الفتحة التناسلية .
- 8 - **مرحلة ما بعد الإلقاء (Stage VII (Spent)) :**
الخصى والمبايض مترهلة بعد وضع البيض وقذف الحيوانات المنوية .
- 9 - **مرحلة النقاهاة (Stage VIII (Resting)) :**
المناسل حمراء خالية في معظمها من البويضات والحيوانات المنوية .

CONDITION INDEX

GONADOSOMATIC INDEX (GSI)

- Fish body weight and weight of gonad
- Identifying days and seasons of spawning → ovaries of females increase in size just prior to spawning.

- Food available to them in water and temperature of water also

الجهاز العصبي

NERVOUS SYSTEM

تركيب الجهاز العصبي Nervous System Structure:

يتكون الجهاز العصبي في الأسماك من :

1. الجهاز العصبي المركزي (CNS) Central Nervous System ويشمل المخ Brain والحبل الشوكي Spinal Cord .
2. الجهاز العصبي الطرفي Peripheral Nervous System ويشمل الأعصاب المخية Cranial Nerves والأعصاب الشوكية Spinal Nerves والأعصاب المغذية للأعضاء الحسية Sense Organs Nerves وهي أعصاب حسية وحركية تربط بين الجهاز العصبي المركزي والأعضاء المستقبلة والمستجيبة للمؤثرات .
3. الجهاز العصبي الذاتي (ANS) Autonomic Nervous System ويعرف أحياناً بالسمبتي ويشتمل على العقد العصبية Ganglia والألياف العصبية Fibers وهو الذي يتحكم في وظائف الأعضاء الحشوية المختلفة Visceral Functions .

ويتكون المخ من :

1 . المخ الأمامي (Prosencephalon) Forebrain والذي ينقسم بدوره إلى مخ طرفي
Telencephalon وسرير المخ Diencephalons .

2 . المخ المتوسط (Midbrain (Mesencephalon) ويشمل الفصين البصريين Optic Lobs .

3 المخ الخلفي (Rhombencephalon) Hindbraine والذي ينقسم بدوره إلى
Metencephalon والذي يشمل المخيخ Cerebellum والنخاع المستطيل
(Myelencephalon) Medulla Oblongata .

(منظر ظهري)

تركيب مخ سمك اللامبري *Petromyzon fluviatilis*

. Olfactory tract شميلة قنطرة . 2	. Olfactory bulb شميلة بصلة . 1
. Pineal body جسم صنوبري . 4	. Cerebral hemispheres نصفي الكرة الشميين . 3
. Cerebellum مخيخ . 6	. Optic lobes فصين بصريين . 5
. Medulla oblongata نخاع مستطيل . 8	. Restiform body جسم رستي . 7
. Internal carotid artery شريان سباتي داخلي . 10	. Spinal nerves أعصاب شوكية . 9
. Hypophysis المهاد . 12	. Mesencephalon مخ متوسط . 11
. Optic chiasma تصالب بصري . 14	. Infundibulum قمع . 13
	. Diencephalon سرير المخ . 15

تركيب مخ سمك كلب البحر *Squalus acanthias*

تركيب مخ سمك البلطي النيلي *Oreochromis Niloticus*

وظائف الجهاز العصبي :

ويمكن تلخيص وظائف الجهاز العصبي فيما يلي :

- 1 . الشم (الفص الشمي) .
- 2 . الإحساس بالضوء (الجسم الصنوبري) .
- 3 . استقبال وإرسال المؤثرات المتصلة بالاتزان الحركي (سرير المخ) .
- 4 . الرؤية (الفصين البصريين) .
- 5 . تنظيم السباحة والنشاط العضلي وتحديد الموقع والتوازن بشكل عام (المخيخ) .
- 6 . التوازن وتنظيم التنفس والتلون والتنظيم الازموزي (النخاع المستطيل) .
- 7 . التعلم وإيصال الرسائل الحسية إلى المستلمات الحركية (الدماغ المتوسط) .

الغدد الصماء

ENDOCRINE GLANDS

Uropophysis (٧) النسيج الذيلي العصبي	Thyroid gland (١) الغدة الدرقية
Gonad (٨) منسل	Pituitary gland (٢) الغدة النخامية
Interrenal (٩) نسيج بين كلوي	Pineal body (٣) الجسم الصنوبري
Guts (١٠) الأمعاء	Chromattin tissue (٤) نسيج كروماتيني
Pancreas (١١) البنكرياس	Juxta glomerular (٥) خلايا جاكستا
Ultimobranchia (١٢) الجسم الخيشومي النهائي	Corpuscles of stannius (٦) كريات ستانيوس

المواقع المختلفة لأنسجة الغدد الصم في الأسماك

الجهاز الهيكلي

SKELETAL SYSTEM

أقسام الجهاز الهيكلي :Skeletal System Division

يكون هيكل الأسماك إما غضروفياً **Cartilaginous** أو عظمياً **Bony** وينقسم إلى ثلاثة أقسام تشمل :

- 1 - الجمجمة **skull** .
 - 2 - العمود الفقري **Vertebral Column** .
 - 3 - هيكل الزعانف **Fins Skeleton** .
- ويمكن أن يقسم تقسيماً آخر إلى هيكل محوري **Axial** ويشمل الجمجمة والعمود الفقري وهيكل طرفي **Appendicular** ويشمل هيكل الزعانف .

هل تعتبر الحراشف هيكل خارجياً؟؟

A Generalised Bony Fish Skeleton

A Primitive Bony Fish Skull

A Generalised Representation of the Skull of a Ray-finned Fish

ب

ا

ج

تعلق الفكوك في الأسماك

ج - الطراز الكامل Holostylytic

ب - الطراز المزدوج Amphistylytic

أ - الطراز اللامي Hyostylytic

Fish Vertebrae

Shark Vertebrae

- الحزام الصدري Pectoral Girdle
- 1 - العظم الغرابي Coracoid Bar
- 2 - غضروف جناحي أمامي Propterygium
- 3 - غضروف جناحي وسطي Mesopterygium
- 4 - غضاريف شعاعية Radials
- 5 - الأهداب القرنية Ceratotrichia
- 6 - غضروف فوق اللوحي Suprascapular
- 7 - نتوء لوحي Scapular Process
- 8 - غضروف جناحي بعدي Metapterygium

الحزام الصدري وهيكل الزعنفة الصدرية في سمك القرش (منظر بطني)

- الحزام الحوضي Pelvic Girdle**
- 1 . غضروف حوضي Puboischiac Bar .
 - 2 . نتوء حرقفي Iliac Process .
 - 3 . غضروف جناحي أمامي Propterygium .
 - 4 . غضروف جناحي خلفي Metapterygium .
 - 5 . غضاريف شعاعية Radials .
 - 6 . الأهداب القرنية Ceratotrichia .
 - 7 . مساعة Clasper .

**شكل الحزام الحوضي وهيكل الزعنفة الحوضية في
 سمك القرش (منظر بطني)**

بعض نماذج للأشعة اللينة والشوكية في الأسماك العظمية

الأعضاء المتخصصة في الأسماك

SPECIALIZED
ORGANS IN FISHES

الأعضاء المتخصصة في الأسماك

الانقليص المكهرب (Electrophorus)

القرموط المكهرب (Malapterus)

السفن المكهرب (Torpedo)

ستارقيزر (Astroscopus)

مورميد (Gnathonemus)

جيمناركس (Gymnarchus)

السمة المدية (Sternarchus)

السمة المدية (Gymnotus)

القوب Skate (Raja)

يوضح مواقع الأعضاء الكهربائية في بعض الأسماك

الأعضاء المنتجة للصوت Sound-producing Organs :

Stridulating Bones تراكيب متخصصة انحسرت في المثانة الهوائية والعظام المصدرة للصوت
Compressed Bony Plate . صريراً حاداً كما في أسماك القرموط من الصفيحة العظمية المضغوطة
والتي تشكلها الأشواك العصبية للفقرات الثالثة والرابعة والخامسة
. تستفيد الأسماك من أصواتها في

. أن تتجمع حول بعضها حسب نوع صوتها لتشكل قطيع واحداً لنوعاً واحداً خاصة أثناء وضع وتلقيح
البيض

. وكذلك تستفيد الأسماك من الصوت في تجميع أفراد النوع الواحد معاً عندما تكون حدة البصر فيها
منخفضة أو تعيش في الأعماق المظلمة
. وتستخدم كذلك الأسماك أصواتها في التحذير من قرب أعدائها .

: Poisonous Glands **الغدد السامة في الأسماك**

.غدد في بعض انواع القرموط وسمكة شبيهة العقرب

.اشواك مسننة مثل السفن

احشاء سامة مثل سمك الفوجو

الإضاءة الحيوية : Bioluminescence

- حاملات الضوء Photophores تنتشر على مواقع مختلفة من جسم الأسماك خاصة على طول الخط الجانبي . ويوجد في الأسماك نوعين من حاملات الضوء هما :
- (أ) حاملات الضوء الذاتية Self-luminous Photophores .
 - (ب) حاملات الضوء البكتيرية Symbiotic Bacteria .

How Shark Eyes Work

©2008 HowStuffWorks

A Diagrammatic Representation of a Teleost Eye

. 2 . القرنية Cornea	. 1 . الصلبة Sclera
. 4 . عضلة مبعدة Rectractor lentis	. 3 . العدسة Lens
. 6 . هلام زجاجي Vitreous humor	. 5 . زائدة منجلية Falciform process
. 8 . شبكية Retina	. 7 . سائل زجاجي Aqueous humor
. 10 . قزحية Iris	. 9 . عصب بصري Optic nerve
	. 11 . زائدة هديبية Ciliary process

التركيب النموذجي لعين الأسماك

Cone cell

تكيفات

- 1- تشبه تركيب عين الفقاريات الاخرى
- 2- لاتركز على اتجاه واحد(ثنائية)
- 3- العين بارزة
- 4- العدسة متحركة
- 5- تلسكوبية
- 6- اعين انبوبية
- 7- مندثرة
- 8- العينين على جانب واحد
- 9- متحركة في كل الجهات
- 10 ذوات الاربع
- 11العصي(Rods) في الظلام ابيض واسود
- 12- المخاريط (Cones)في النهارباقي الاوان

دورق
Lagena
كيس
Sacculus

شكوه (قربة)
Utriculus

جهاز ويبيري (أ) والاذن الداخلية لسمة عظمية (ب) اين يوجد الحصى السمعي؟؟ والفائدة (توازن وعمر) السهمي Sagitta والنجمي Asteriscus واللوية Lapillus

الخط الجانبي Lateral Line:

جهاز الخط الجانبي عبارة عن مجموعة من الأعضاء الحسية المعروفة بالخلايا الخشائية العصبية Neuromasts المنتشرة في قناة الخط الجانبي Lateral Line Canal والتي تتواجد على طول جسم الأسماك أو على رأسها وقد يوجد أكثر من خط جانبي على جسم الأسماك . ويمكن أن تنتشر الخلايا الخشائية الحسية على أجسام الأسماك أو في حفر خاصة . يملأ القنوات الجانبية مخاط ويمر الجزء الرأسي من هذه القنوات عبر عظام الجمجمة أو الحراشف بفتحة كبيرة أو صغيرة للخارج حسب المجموعة السمكية . وتتكون كل خلية خشائية من خلايا حسية شعيرية Sensory Cells تنتهي بأهداب حساسة Sensitive Hair وتغطي بالكويب الجلاتيني Cupula ومتصلة بأعصاب دقيقة متصلة بالعصب الرئيسي ومن ثم بالجهاز العصبي . ويتم تحريك الكويب بواسطة الماء المحيط مباشرة عندما لا توجد قناة (مكشوفاً) أو بالماء ثم بالمخاط المحيط في قناة الخط الجانبي .

الخط الجانبي (أ) (تحديد الاتجاه
 وضغط الماء والمفتربات) وقنينة
 لورنزيني (ب) (استقبال كهربائي)

١ — أنبوب يؤدي إلى السطح	Tube to surface
٢ — فتحة الخط الجانبي	Part of lateral line
٣ — حويصلات	Ampullae
٤ — عصب	Nerve
٥ — عضو خشائي	Neuromast organ
٦ — قناة الخط الجانبي	Lateral line canal
٧ — عصب	Nerve
٨ — كوب	Cupula
٩ — حرشفة	Scale
١٠ — أنبوبة عبر الحرشفة	Tube through scale

أعضاء الشم :Olfactory Organs

توجد أعضاء الشم في أكياس شممية بالفتحات الأنفية للأسماك أمام العين مباشرة .
وتترتب الخلايا الطلائية الشممية على هيئة سلسلة من الإمتدادات التي تشبه
الأصابع أو بالتفاف الطلائية الشممية على هيئة ورديات **Rosettes**.

انواع الورديات

ذات زوائد متشابكة أو محدبة أو مسطحة وكل هذه التحورات لكي توفر مساحة كبيرة
للماء لتتميز رائحة المواد المذابة به.

تروى هذه الورديات بالماء في الكيس الأفقي إما بحركة السمكة نفسها أو
عن طريق حركة أهداب الكيس أو إمتداداته أو تقلص الكيس والأكياس المساعدة فيه .

وتكمن اهمية الشم في تحديد نوع الغذاء والأعداء وكذلك قطيع
الأسماك المناسب

أ - الوردة المعقدة ذات الزوائد الشبيهة بالأصابع ب - وردة محدبة ج - وردة مسطحة

كيس العوم Gas bladder المثانة الغازية/

Transverse Section of a Teleost Fish Body

The Swim Bladder of a Carp

A Physostomous Swim Bladder

← Pneumatic duct

شكل مثانة الاسماك العظمية

وظائف كيس العموم

- كيس رقيق الجدار به اكسجين وثاني اكسيد الكربون ونيتروجين
- متصل بالمرئ او المعدة بقناة تنفسية (pneumatic) في الاسماك مفتوحة الكيس الهوائي (physostomous) مثل الانقليس
- مغلق في الاسماك مغلقة الكيس الهوائي (physoclistics) مثل البلطي
- له فروع في اسماك الطبلة
- لا توجد في اسماك القاع ولا العظروفية وعديمة الفكوك
- غدة الغاز (gas gland) لامداد الاكسجين والتركييب البيضاوي (oval) لطرد الغاز
- تساعد الاسماك العظمية على الطفو.... كيف؟؟
- القرش يسبح دائما الى الامام ويرفعه الذيل غير المتجانس والزعنفة الصدرية العريضة ودهن السكوالين على الطفو

وظيفة تنفسية- الاسماك الرئوية - الشبوط وخزن الاكسجين
وظيفة حسية مع جهاز ويبيري في الشبوطيات
وظيفة سمعية- مثل الشبوطيات

انتاج الصوت -مثل الشبوط عن طريق قناة التنفس وجدار المثانة
مثل سمك الضفدع وسمك المقداح
وظيفة الطفو وهي الرئيسة..كيف يتم؟؟

ويعتقد أن لصوت المثانة دور في اتصالات الأسماك فيما بينها
خاصة وأن هذه الأصوات تكون خلال فترة التزاوج وتستخدم
الأسماك صوت المثانة كذلك للدفاع وتخويف الأعداء ويعتقد أن
السمكة شبيهة الضفدع لها نقيق مثل نقيق الضفادع .

التذوق Taste :

تنتشر براعم التذوق Taste Buds على السطح الخارجي لجسم الأسماك ورأسها وزعانفها ، ولكنها تتمركز في الفم والبلعوم والأقواس الخيشومية في الأسماك العظمية .
وتتكون براعم التذوق من خلايا قاعدية وخلايا داعمة وخلايا مستقبلية.

وتكمن أهمية التذوق في تحديد مكان الغذاء وطعمه حيث من المعروف أن لبعض أسماك القرش ردود أفعال تجاه المواد الحامضية والأملاح ويشاركها في ذلك معظم الأسماك .

التنظيم الاسموزي في الاسماك العظمية

الاسماك العظمية في الماء العذب

- 1- الجسم 300ملي ازمول/كغم/ الوسط اقل من 5
- 2- تمتص الماء خلال الخيشيم والجلد
- 3- تحصل على الاملاح من خلال خلايا الكلوريد وملح الطعام
- 4- الاملاح تفقد عن طريق البراز
- 5- بول مخفف لطرح ماء كثير واملاح

اسماك المياه المالحة

- 1- الجسم 400 ملي ازمول/كجم/الوسط 1000ملي ازمول/كجم
- 2- تفقد الماء خلال الخياشيم والجلد
- 3- تطرح الاملاح خلال خلايا الكلوريد في الخياشيم
- 4- تحصل على الماء والاملاح بابتلاع الماء والغذاء
- 5- تفقد الاملاح عبر البراز
- 6- تفقد املاح وماء قليل

التنظيم الاسموزي في الغظروفيات

-الجسم 1100ملي ازمول/كغم/الوسط 1000ملي ازمول/كغم

1- تمنع الخياشيم فقد اليوريا واكسيد الامين الميثيلي
الثلاثي(TMAO)

2- يمتص الجلد والخياشيم الماء

3- تؤخذ الاملاح مع الغذاء

4- تفقد الاملاح بالخروج

5- يفرز الصوديوم من غدة المستقيم

6- تفرز الايونات ثنائية التكافؤ في البول

7- الكلية تحفظ اليوريا ومادة اكسيد الامين الميثيلي
الثلاثي(TMAO)

هجرة وسلوك الأسماك

FISH BEHAVIOR AND MIGRATION

الهجرة Migration :

هجرة الأسماك بأنها عبارة عن الحركة الجماعية للأفراد السمكية عبر طرق محددة من منطقة إلى منطقة في وقت محدد سنوياً.

لماذا تهاجر الأسماك؟؟ للبحث عن الغذاء (**هجرة الغذاء**) أو للتكاثر (**هجرة التكاثر**) أو للحماية من التغيرات المناخية (**هجرة التشتتة**) .

. يختلف مفهوم هذه الهجرة عن **الهجرة الخارجية Emigration** التي تعبر عن حركة الحيوانات باتجاه واحد إلى الخارج وبدون عودة .

وكذلك **الهجرة الداخلية Immigration** والتي هي عبارة عن هجرة الحيوانات باتجاه واحد إلى الداخل . تتأثر هجرة الأسماك بكثير من العوامل مثل درجة الحرارة ، الملوحة ، **Ph** ، النضوج الجنسي والحالة الفسيولوجية العامة للأسماك .

وعادة ما توصف الأسماك المهاجرة بأنها ثنائية الهجرة **Diadromous** .
مهاجرة إلى داخل المياه العذبة **Potamodromous** أو مهاجرة إلى داخل المياه البحرية **Oceandromous** .

الأسماك ثنائية الهجرة هي الأسماك التي تهاجر من البحار والمحيطات إلى المياه العذبة أو التي تهاجر من المياه العذبة خاصة الأنهار إلى المياه المالحة . **قسمت الأسماك حسب ذلك إلى المجاميع التالية :**

(أ) **الأسماك ذوات الهجرة الصاعدة Anadromous :**

وهي الأسماك التي تقضي معظم وقتها في البحر وتهاجر للماء العذب عبر ممرات مائية معروفة للتناسل مثل أسماك السلمون **Salmons** واللامبري البحري **Sea Lamprey** .

(ب) **الأسماك ذوات الهجرة النازلة Catadromous :**

وهي عبارة عن الأسماك التي تمضي معظم وقتها في المياه العذبة كالأنهار وتهاجر إلى البحر للتناسل سمك الانقليس **Anguilla Anguilla** .

(ج) **الأسماك مزدوجة الهجرة Amphidromous :**

وهي عبارة عن الأسماك التي تستطيع أن تهاجر هجرة غير تكاثرية من البحر إلى المياه العذبة وفي نفس الوقت تهاجر من المياه العذبة إلى البحر مثل بعض أسماك عائلة القبيون

Gobiidae

Fish Behavior سلوك الأسماك

لماذا يدرس سلوك الاسماك؟؟

.الاهمية الاقتصادية

. تربية الاسماك

. القدرة على التعلم

. فهم الطبائع اغريزية

. الدراسات البيئية العلاقات المختلفة

طرق دراسة سلوك الأسماك Methods of fish behavior studies

دراسة توزيع الأسماك : Distribution

1- تتبع سلوك الأسماك عن طريق تسجيل أعدادها باستخدام المسابير الضوئية Eco-sounders أو عن طريق تعليمها بأعلام مختلفة Tags بحيث ترقم هذه الأعلام وتحتوي على معلومات عن السمكة وكذلك العنوان ويطلب ممن يصيد الأسماك المعلمة إرسال هذه الأعلام حسب العنوان الموضح في كل علم لكي يتم دراسة مدى توزيع الأسماك . ويمكن تتبع الأسماك باستخدام Radio transmitters أو جهاز Aerials حيث ترسل إشارات تشغيلها أجهزة خاصة لدى المهتمين بدراسة سلوك الأسماك (أنظر Everhart & Youngs, 1981) .

2 . تصوير بالفيديو Videocameras

تتبع سلوك الأسماك بواسطة آلات تصوير خاصة (انظر Bone et al., 1999) .

3 . الاكتوجراف Ectograph

يستخدم تسجيل حركة الأسماك في المختبرات .

4 . القدرات الحسية Sensory Capabilities

تدرب الأسماك على القدرة على الاستجابات المناسبة للمؤثرات كاستجاباتها للحزم الضوئية المؤقتة أو مكافئتها على استجابتها بإعطائها نوع معين من الغذاء أو معاقبتها على سلوك آخر بالصدمة الكهربائية المؤقتة Electric shock .

أنماط سلوك الأسماك Fish Behavior Patterns

1. سلوك التَغْذِي Feeding Behavior :

تبحث الأسماك عن غذائها وتختاره بعناية إذا تركت بحريتها وكذلك تستطيع التوقف عن البحث عن الغذاء بإرادتها حسب الظروف الفسيولوجية التي تتحكم بها . وتقوم الأسماك بذلك لسد حاجتها من الطاقة الضرورية لأنشطتها المختلفة أي أن الأسماك تحافظ على نجاحها التكاثري خلال فترة بقائها على قيد الحياة **Fitness** .

تختلف الأسماك في طرق حصولها على الغذاء فالسباحة السريعة تساعد الأسماك المفترسة من الحصول على غذائها بكفاءة أكثر من غيرها . وبعض الأسماك كالأسماك الزواية *Lophius Piscatorius* ترصد كميناً لفرائسها بحيث تستلقي جانبياً بانتظار مادتها الغذائية .

2..سلوك التكاثر Reproductive Behavior :

.لتربية الاسماك في مرابي لابد من فهم سلوكها في الطبيعة

.لتربية اسماك الزينة

.لفهم وقت التكاثر ووقت فقس البيض

.فهم العوامل المحددة للتكاثر

3- الأسراب السمكية Schooling :

يطلق على السرب School حسب تعريف Pitcher في عام 1993م والذي نص على أنه مجموعة من أفراد الأسماك التي تسبح في نفس السرعة وبتنظيم متوازٍ بمسافات متقاربة.

وبالرغم من أن هذا التعريف عام للسرب إلا أن معظم الباحثين في سلوك الأسماك يرون أن السرب عبارة عن مجموعة من الأفراد التابعة لنفس النوع والتي تتجمع بصورة مؤقتة ومعظم أفرادها في طور واحد من دورة الحياة وتظهر عملاً منتظماً ينتفع منه جميع أفراد السرب . ويتكون السرب عادة من الأسماك المتقاربة حتى تستطيع أن تسبح بنفس السرعة تقريباً . وحتى يسهل تكوين السرب لابد من التشابه في المظهر الخارجي كاللون الواحد وتقارب حجم الجسم . ويبدو أن تكون السرب يساعد على زيادة كفاءة الأسماك في الحصول على غذائها والدفاع عن أفراد السرب واكتشاف الخطر الذي قد يحدث في الأسماك وكذلك زيادة القدرة على الحركة والتعرف على الجنس . وللسرب أنواع متعددة يمكن إيجازها فيما يلي :

1 . السرب الكبير Shoal :

يضم السرب الكبير الأسماك التي تتماثل في القدرة البيولوجية والعمر والسلوك .
وتختلف أشكاله في أفراد النوع الواحد كما هو معروف عندما يتشكل سرب سمك السردين
Sardinops Sagax . ولا يستمر قائد السرب الكبير في قيادته حيث كثيراً ما يتراجع
عن قيادته وتحل محله سمكة أخرى من نفس القطيع .

2 . السرب الصغير School :

عادة ما يكون في داخل حدود السرب الكبير وهو عبارة عن تجمع أصغر من
السرب الكبير .

3 . السلالة Race :

عبارة عن مجموعة من الأسماك تميزت بصفات مورميرتها عن غيرها من
السلالات ، وذات أعمار مختلفة ترتاد مناطق تكاثر وتغذية وتشتتة فولوجية (ظاهرية)
معروفة .

4 . الجماعة الأولية Primary Population :

عبارة عن نواة من الأفراد في مكان التكاثر لها نفس العمر والحالة البيولوجية .

5 . الحشد Cluster :

تجمع مؤقت لبعض الأسراب الكبيرة أو الجماعات الأولية من الأسماك . ويتكون الحشد لغرض التكاثر أو التغذية أو التشتتة

(ب)

(د)

(ج)

(ا)

الشكل (١٩-٢) يوضح أسرابا من الأسماك .

توزيع الأسماك

FISH ZOOGEOGRAPHY

المجاميع السمكية (العوائل)	عدد الأنواع	الإقليم
<p>الأسماك الرئوية (Lepidosirenidae) Lung Fishes . سمك البشير Bichirs والقصب (Osteoglossidae) . الشبوط Reed Fishes (Polypteridae*) Catfishes (Characidae) . القرموط Minnows (Cyprinidae) Gouramis (Anabantidae, Mormyridae*) . قورميز (Ictaluridae) Killifishes (Mastacemblidae) . البلطي Cichlids (Cichlidae) . الحراسين Puffer (Tetraodontidae) . البوفر (Cyprinodontidae) Herrings (Sygrathidae) . Pipefishes (Mugilidae) . الرنكة Mullets (Distichodotidae, Snooks (Centropomidae) . السنوك (Clupeidae) . الكراسين . Hepsetidae, Ichthyboridae)</p>	2000	<p>الأفريقي (الأثيوبي) african (Ethiopian Region)</p>
<p>الكراسين (Characidae) Characins . القرموط (Siluridae) Catfishes . الأسماك المكهربة (Gymnotidae) Electric Fishes . قرموط (Callichthyidae*) Catfishes Doradidae*, Diplomystidae, Loricaridae*) . البلطي (Cichlidae) Cichlidae . الحراسين Killifishes (Cyprinodontidae) . سمك البعوض (Poeciliidae) Livebearers رباعية الأعين (Jenynsiidae) Four Eyed Jenynsiids (Anablepidag) . الأسماك الرئوية Lung Fishes (Lepidosirenidae) . عظمية اللسان (Osteoglossidae) Bony-tongue . اللواسع Stingray (Potamotrygonidae) . سمك موسى (Soleidae) sole . الرنكة Herring (Clupeidae) . اليلم (الانشوفه) (Engraulidae) Anchovies . أسماك الطبله Drums (Scianidae) . اللامبري (Geortiidae, Mordaciidae) Lamprey . البولي Bullies (Galariidae) . السملت الجنوبي Southern-smelts (Aplochitonidae) . ذوات الممص . Suckers (Catostomidae)</p>	2800	<p>المداري الجديد Neotropical Region</p>

المجاميع السمكية (العوائل)	عدد الأنواع	الإقليم
<p>الشبوط (Cyprinidae*) Minnows . القرموط Catfishes (Clariidae-bagridae) . اللوشز . (Psilorhynchidae) . Hillstream (Homalopteridae) . أسماك الينابيع Loaches (Cobitidae) . الانفيلس شبيهة رأس الثعبان Snakehead (Channidae) . الانفيلس ذو الشوكة Spiny Eel . القورمي المتسلق Climbing Gouramis (Mastacemblidae) . البطني Cichlidae (Cichlidae) . الحراسيت Killifishes (Cyprinodontidae) . ورقية الشكل (Nandidae) Leaf-fishes . القورمي Gouramis (Belontidae) - أسماك شبيهة الساطور Knife-fishes (Notopteridae) . أنفيلس Sleepers . القويون Synbranchid (Synbranchidae) . السليبرز Gobies (Gobiidae) . عظيمة اللسان (Eleotridae) . Bony Tongue (Osteoglossidae)</p>	1649	<p>الإقليم الشرقي Oriental Region</p>
<p>الشبوط (Cyprinidae*) Minnows . اللوشز . Loaches (Cobitidae) . القراميط (Sisoridae) Catfishes . (Channidae) . (Percidae) . Suckers (Catostomidae) . ذوات الممص Bagridae, Siluridae . (Cyprinodontidae) . (Esocidae) . (Umbridae) . السالمون (Salmonidae) . السكوليين (Comephoridae و Sculpins Cottocomephoridae*) Gobies (Gobiidae)</p>	444	<p>القطبي القديم Palaeartic Region</p>
<p>الشبوطيات (Cyprinidae) Minnows . الفرخ (Percidae) Perches & Darters . الحراسين Killifishes (Cyprinodontidae) - ذوات الممص (Catostomidae) Suckers . قراميط أمريكا الشمالية North American Catfishes (Ictaluridae) . Sunfishes (Centrarchidae) . السالمون والسماك الأبيض والتروت (Salmonidae) Salmon, Trout, Whitefishes . السكوليين (Cottidae) Sculpins . الحفش (Acipenseridae*) Sturgeons . أبو ملعقة (Polydontidae*) Paddle Fishes . ذوات المنقار Gars (Lepisosteidae) . البوفن (amiidae) Bowfin . ذوات العيون الذهبية والقمرية Moone & Gold Eyes (Hiodontidae) . شبوط الطين Mud Minnoes (Umbridae) . فرخ التروت Trout Perch (Percopsidae) . أسماك الكهوف (Amblyopsidae) Cavefishes . فرخ البايروت Pirate Perch . الكارسين (Characidae) Characins . البطني (Cichlidae) Cichlids . اللامبري (Petromyzontidae) Lampreys . سمك البعوض (Poeciliidae) Livebearer</p>	700	<p>القطبي الجديد Nearctic Region</p>

المجاميع السمكية (العوائل)	عدد الأنواع	الإقليم
<p>Bonytongue . Lung Fishes (Ceratodidae) . عظمية اللسان . Lampreys (Mordaciidae, Geotriidae) . اللامبري (Osteoglossidae) Smlet . Bullies (Galaxiidae) . البوليز . Eel (Anguillidae) الأنفيلس Marine Catfishes . قراميط البحر (Aplochitonidae-retropinnidae) . Gobies (Gobiidae) . القوبيون (Plostosidae, Ariidae) . الأسماك القزحية Silversides . سلفرسايد . Rainbowfishes (Melanotaeniidae) Snooks . السنوك . Tiger Perch (Theraponidae) . فرخ النمر (Atherinidae) Sea . ذئب البحر . Aholeholes (Kuhliidae) . الهولهلول (Centropomidae) . Lampreys (Geotriidae) . اللامبري . Basses (Serranidae) . Sleepers (Eleotridae) . السيلبرز . Flounders (Pleuronectidae) . Sand Perches (Mugiloididae) . سمك الفرخ الرملي</p>	193	الإقليم الأسترالي Australian Region

عوائل الأسماك البحرية في الأقاليم البحرية في العالم

المجاميع السمكية (العوائل) (Fish Groups (Families)	عدد الأنواع	الإقليم
(Muraenidae) Morays, (Holocentridae) Squirrelfishes, (Scorpaenidae) Scorpion Fishes, (Serranidae) Sea Basses, Apogonidae, Carangidae, (Lutjanidae) Snappers, Mullidae, Chaetodontidae, Pomacentridae, Labridae, (Scaridae) Parretfishes, (Blenniidae) Needlefishes, Acanthuridae, (Teraodontidae) Puffers, Pegasidae, Silliginidae, Karaemeriidae, (Siganidae) Rabbitfisjes And Plesiopidae.	290	المحيط الهندي . الهادي The Indo-pacific Region
أنواع مشتركة بين أنواع شرق المحيط الهادي وغرب الأطلسي (ملاحظة : توجد حالات استيطان في هذا القليم) .	800	شرق المحيط الهادي The Eastern Pacific Region
(Ariidae) Sea Catfishes, (Gobiidae) Gobies And (Sciaenidae) Croakers.	غير معروف	غرب المحيط الأطلسي The Wester Atlantic Region
أنواع مشتركة مع أنواع غرب المحيط الأطلسي ولكن قد توجد بعض الأنواع المستقلة .	443	شرق المحيط الأطلسي The Eastern Atlantic Region
(Mugilidae) Mulletts, (Labridae) Wrasses, (Gobiidae) Gobies, (Scaridae) Parrot Fishes, (Mullidae) Goatfishes, (Sparidae) Porgies, (Cottidae) Sculpins, (Agonidae) Poachers, (Gadidae) Cods, (Cyclopteridae) Snailfishes And (Pleuronectidae) Righteye Flounders.	540	المحيط الأطلسي البحر المتوسط Mediterranean-Atlantic Region

المجاميع السمكية (العوائل)	عدد الأنواع	الإقليم
(Embiotocidae) Viviparous Perches, (Anoplopomatidae) Sablefish And Skilfish, (Hexagsammidae) Greenlings, (Cotidae), (Salmonidae), (Scarpaenidae) (Blennidae), (Stichaeidae), (Agonidae), (Pleuronectidae) And (Clinidae).	800	الشمال الأمريكي للمحيط الهادي The North American Pacific Region
(Embiotocidae), (Pleuronectidae), (Hexagsammidae), (Cottidae), (Cyclopteridae) Lump-suckers And Snail Fishes And (Zoarcidae) Eelpouts.	565	المحيط الهادي . الآسيوي The Asian-pacific Region
(Pleuronectidae) Righteye Flounders, (Gadidae) Cods, (Cyclopteridae) Snailfishes, (Cottidae) Sculpins, (Stichaeidae) Pricklebacks, (Sciaenidae) Croakers, (Salmonidae), (Serranidae) Sea Boss, (Sparidae) Porgies, (Labridae) Wrasses, (Pomadasyidae) Grunts, (Clupeidae), (Anguillidae).	400	الشمال الأمريكي للمحيط الأطلسي North American Atlantic Region
(Clupeidae) Herring, (Engraulidae) Anchovies (Carangidae) Jacks, (Serranidae) Seabass, (Sciaenidae) Croakers, (Pomadasyidae) Grunts, (Zoarcidae) Eelpouts, (Gadidae) Cods, (Scorp-aenidae) Rockfishes, (Nototheniidae) Plunderfishes, (Bovichthyidae), (Cheilodactylidae), (Aplodactylidae), (Normanichthyidae), (Congiopodidae), (Latridae).	غير محدد	جنوب أمريكا South American Region
(Clinidae), (Zoarcidae), (Cyclopteridae), (Batrachoididae), (Gobiesocidae), (Blenniidae), (Gobiidae), (Congiopodidae), (Oplegnathidae), (Pentacerotidae) And (Callorhynchidae).	غير محدد	جنوب أفريقيا South African Region
(Ostraciodontidae), (Bovichthyidae), (Clinidae), (Rajidae).	230	الأسترالي Australian Region
(Nototheniidae) Antarctic Cods, (Bathydraconidae) Antarctic Dragon Fishes, (Harpagiferidae) Plunder Fishes, (Rajidae) Skates, (Channichthyidae) Icefishes, (Zoarcidae) Eelpouts, (Muraenolepididae) Eelcods, (Bothidae) Left Eye Flounder, (Cyclopteridae) Snailfishes, (Myctophidae), (Gonstomatidae), (Paralepidae), (Scopelarchidae), (Bathylagidae).	غير محدد	القطب الجنوبي Antarctic Region

تنوع الأسماك في المملكة
العربية السعودية

FISH DIVERSITY IN
SAUDI ARABIA

* الإقليم القطبي القديم Palearctic region

* الإقليم القطبي الجديد Nearctic region

* الإقليم الشرقي Oriental region

* الإقليم الأسترالي Australian region

* الإقليم الأفريقي (الأثيوبي) Ethiopian region

* الإقليم المداري الجديد Neotropical region

الشكل (٢٠-١) مناطق توزيع الأسماء في العالم.

(المصدر : Bond, 1979)

أسماك المياه العذبة **Freshwater Fishes** : *

لم تعرف أسماك المياه العذبة في شبه الجزيرة العرب قبل الدراسة التي أعدها بولينجر Boulenger في عام 1886م عندما وصف نوع واحد من مسقط في عمان . لكن الدراسات توالى بعد ذلك بدراسة هذه الأسماك وتوصلت إلى أنه حصر عشرون نوعاً في المياه العذبة في شبه الجزيرة العربية عشرة أنواع منها توجد في المياه الداخلية (الغدران . الينابيع . الجداول الصغيرة . العيون) في المملكة العربية السعودية .

عائلة الشبوط **Family : Cyprinidae**

لا توجد زعنفة دهنية لأفراد هذه العائلة كذلك لا توجد أسنان على الفكوك والجسم عادة مغطى بالحرشف والأسنان البلعومية عبارة عن صف إلى ثلاث صفوف على القوس الخيشومي الخامس .

جنس **Genus : *Barbus* Cuvier, 1417**

حراشف أفراد هذا الجنس متوسطة الحجم أو صغيرة . الشوكة الثالثة في الزعنفة الظهرية في بعض الأنواع مسننة لكنها في الأنواع التي في مياه شبه جزيرة العرب غير مسننة . لا يوجد غطاء عمدي على طرفي الشفاه الأمامية . يوجد زوجان أو زوج من الملامس . ترتيب الأسنان البلعومية (2،3،5) . (2،3،5) أو (4،3،2،2،3،4) . يوجد خمس أو ست دعائم شعاعية متفرعة في الزعنفة الشرجية . ويتميز هذا الجنس عن غيره من الأجناس بوجود الملامس ووجود أقل من سبع دعائم شعاعية متفرعة في الزعنفة الظهرية . ويضم هذا الجنس ثلاثة أنواع في شبه الجزيرة العربية ، هذه الأنواع هي :

: *Barbus Arabicus* - 1

يتميز هذا النوع عن النوعين الآخرين بوجود خمس دعائم شعاعية متفرعة في الزعنفة الشرجية . وينتشر هذا النوع في الجداول المائية متوسطة الحجم في الأودية الساحلية الجنوبية والجنوبية الغربية في شبه الجزيرة العربية وسجل من منطقة جازان في المملكة العربية السعودية .

: *Barbus Apoensis* - 2

يتميز هذا النوع بوجود ست دعائم شعاعية متفرعة في الزعنفة الشرجية وزوج من الملامس حول الفم . وينتشر هذا النوع بكثرة في العيون والجداول المائية المنتشرة حول مدينة أبها وكذلك وادي تربة في الطائف ووادي هدية بقرب مدينة خيبر في منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية .

: *Barbus Exulatus* - 3

يتميز هذا النوع بامتلاكه زوجين من الملامس حول الفم وبوجود 7-9 دعائم شعاعية متفرعة في الزعنفة الشرجية . وينتشر هذا النوع في الجداول الصغيرة المنتشرة في وادي حضرموت في جنوب شبه الجزيرة العربية ولم يسجل حتى الآن وجوده في جداول أو عيون المياه العذبة في المملكة العربية السعودية .

جنس *Cyprinion* Heckel, 1943

يتميز هذا الجنس بطوله المتوسط (147.70 ملم الطول الكلي) وكذلك الحراشف من النوع متوسط الحجم . توجد في الزعنفة الظهرية من 3 إلى 4 أشواك مسننة . الفم تحت طرفي **Subterminal** . ترتيب الأسنان البلعومية (2 ، 3 ، 4 . 4 ، 3 ، 2) . ويتميز هذا الجنس عن غيره من الأجناس بوجود غمد **Sheath** قرني سميك يغطي حافة الشفة السفلى وسبع دعائم شعاعية في الزعنفة الشرجية ، وقد سجل في مياه شبه الجزيرة العربية الأنواع والنويعات التالية :

1 . *Cyprinion Mhalensis*

يتميز بوجود 20 حرشفة حول السويقة الذيلية **Caudal Peduncle** وأكثر من (7) حراشف بين الخط الجانبي ومنشأ الزعنفة الظهرية ، وينتشر في بعض الأودية المحيطة في مدينة أبها والطائف في المملكة العربية السعودية .

2 . *Cyprinion Acinaces Acinaces*

يتميز بوجود 16-18 حرشفة حول السويقة الذيلية وأقل من (8) حراشف بين الخط الجانبي ومنشأ الزعنفة الظهرية ، ويتراوح عدد الأسنان الخيشومية **Gill Rakers** على الجزء السفلي من القوس الخيشومي الأول ما بين (8) و (11)، وينتشر في وادي حزموت في اليمن جنوب شبه الجزيرة العربية .

3 . *Cyprinion Acinaces Hijazi*

يتميز هذا النويع عن **C. Acinaces Acinaces** بأن عدد الأسنان الخيشومية على الجزء السفلي من القوس الخيشومي الأول يتراوح ما بين (10) و (13) . وينتشر في عيون المياه العذبة في خيبر شمال غرب المدينة المنورة وبعض أودية القنفذة في المملكة العربية السعودية .

4 . *Cyprinion Microphthalmum Muscatensis*

يتميز هذا النويع عن غيره من أنواع هذا الجنس بأن الشوكة الأخيرة في الزعنفة الظهرية مزودة بأسنان ضعيفة جداً بينما هذه الأسنان قوية في أشواك الزعانف الظهرية في الأنواع الأخرى . وينتشر هذا النويع في مسقط وعمان جنوب شرق شبه الجزيرة العربية .

جنس Genus : *Garra* Hamilton, 1822

يتميز هذا الجنس عن غيره من الأجناس بوجود قرص في Mental Disc تحت الفك السفلي ويشمل هذا الجنس الأنواع والنوعات التالية :

1 . *Garra Longipinnis* :

توجد (12) حرشفة حول السويقة الذيلية والجسم أسطواني في أفراد هذا النوع . الزعنفة الظهرية طويلة (28 % من الطول القياسي) ويوجد أقل من (15) سن خيشومي على الحافة السفلية للقوس الخيشومي الأول ، ينتشر هذا النوع في المياه العذبة في عمان .

2 . *Garra Mamshuga* :

يتميز أفراد هذا النوع بأن السويقة الذيلية تحيط بها (12) حرشفة وأنها أسطوانية الجسم لكن الزعنفة الصدرية قصيرة (19 % من الطول القياسي) وسجل تواجد هذا النوع في مياه وادي حزموت في اليمن .

3 . *Garra Barreimiae Barreimiae* :

يتميز هذا النوع بوجود (12) حرشفة حول السويقة الذيلية وأن أجسام أفراد هذا النوع مكتنزة ويوجد أقل من (11) سن خيشومي على الجزء السفلي من القوس الخيشومي الأول ، وينتشر هذا النوع في المياه العذبة في عمان .

4 . *Garra Barreimiae Shawkahensis*

يتميز بنفس صفات النوع السابق فيما عدا أن لها أكثر من (14) سن خيشومي على الجزء الأسفل من القوس الخيشومي الأول . وسجل هذا النوع من المياه العذبة في عمان .

5 . *Garra Buettikeri*

تحاط السويقة الذيلية في أفراد هذا النوع بـ (20) حرشفة دائرية . ويوجد (7) دعائم متفرعة في الزعنفة الظهرية . وينتشر هذا النوع في وادي تربة بمدينة الطائف وبعض مياه الأودية الصغيرة في منطقة عسير من المملكة العربية السعودية .

6 . *Garra Tibanica Tibanica*

توجد (7) دعائم شعاعية متفرعة في الزعنفة الظهرية و (16) حرشفة حول السويقة الذيلية . ينتشر هذا النوع جنوب غرب وغرب شبه الجزيرة العربية . وسجل في المملكة العربية السعودية من المياه العذبة في جازان وأبها في عسير وعيون مدينة خيبر شمال المدينة المنورة .

7 . *Garra Sahilia Sahilia*

يتميز هذا النوع بوجود ما بين (14) و (20) حرشفة حول السويقة الذيلية ووجود (8) دعائم شعاعية متفرعة في الزعنفة الظهرية وأكثر من عشرة أسنان خيشومية على الجزء السفلي من القوس الخيشومي الأول . وسجل هذا النوع من تفرعات في وادي حضرموت في اليمن .

8 . *Garra Shilia Gharbia*

يتميز هذا النوع عن النوع السابق (*G. Sahilia Sahilia*) بوجود أقل من (11) سن خيشومي على الجزء السفلي من القوس الخيشومي الأول .

جنس **Genus : *Acanthobrama* Heckel, 1843**

يتميز أفراد أنواع هذا الجنس بعدم وجود لوامس **Barbles** حول منطقة الفم وأكثر من (10) دعائم شعاعية متفرعة في الزعنفة الشرجية .

:*Acanthobrama Hadiyahensis*

يتميز هذا النوع بوجود (7) دعائم متفرعة في الزعنفة الظهرية وما بين (14) إلى (17) دعامة متفرعة في الزعنفة الشرجية . وسجل هذا النوع من مياه وادي هدية جنوب غرب مدينة خيبر بمنطقة المدينة المنورة وكذلك في عيون مدينة خيبر بالمملكة العربية السعودية .

Family : Cyprinodontidae عائلة

لا يوجد عضو إيلاج **Gonopodium** في ذكور أفراد هذه العائلة . توجد حراشف مشطية **Ctenoid** تتميز بوجود أسنان صغيرة على الناحية الخلفية . تنتشر الحراشف على منطقة الرأس . لا يوجد خط جانبي .

جنس **Genus : *Aphanius* Nardo, 1827**

أجسام أفراد هذا الجنس صغيرة (100 ملمتر) السطح العلوي من الرأس مفلطح . والفم علوي **Superior** . لا توجد لوامس . لا توجد زعنفة دهنية **Adipose Fine** . لا يوجد خط جانبي .

Aphanius Dispar Dispar

تتميز أفراد هذا النوع بعدم وجود عوارض **Transverse Bars** على طول الجسم في الذكر وإن وجدت تنحصر في السويقة الذيلية . أما في الأنثى فتوجد هذه العوارض وقد يصل عددها إلى أحد عشر عارضاً . ينتشر هذا النوع في المياه العذبة والمالحة في شبه الجزيرة العربية ، وتجدر الإشارة إلى النوع ***A. Dispar*** ***Richardsoni*** يوجد في المياه العذبة المحيطة بمنخفض البحر الميت بالأردن .

Family : Poeciliidae عائلة

الأسماك عادة في هذه العائلة صغيرة الحجم لكن قد يصل طولها إلى 180 ملم . يوجد عضو ولوج **Gonopodium** في الذكر وهو عبارة عن استطالة للدعائم الشعاعية الأمامية للزعنفة الشرجية **Anal Fin** . التلقيح داخلي وإناتها ولودة .

جنس *Gambusia* Poey, 1855

البوز غالباً غير ممدود ، توجد أسنان في الفكوك . حراشف كبيرة نوعاً ما . الزعنفة الشرجية في الذكر متحورة إلى عضو ولوج (Intromittent Organe (Gonopodium) .

***Gambusia Affinis* - 1**

حجم الجسم لا يتجاوز 60 ملم . يوجد ما بين (12) إلى (14) سن خيشومي على الناحية الأمامية من القوس الخيشومي الأول . تدعم الزعنفة الظهرية بسبع دعائم شعاعية بينما تدعم الزعنفة الشرجية بتسع دعائم شعاعية . ويوجد من (25) إلى (28) حرشفة على الخط الجانبي . وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الأنواع غير المحلية (المجلوبة) للمياه العذبة في المملكة العربية السعودية وذلك للقضاء على يرقات البعوض حيث سجلت في عيون الخرج والعديد من عيون الهفوف في الأحساء وكذلك القطيف .

***Poecilia Latipinna* - 2**

يوجد ما بين (13) و (14) دعامة شعاعية في الزعنفة الظهرية . الصفة المميزة لذكور هذا النوع عن غيره من أنواع الجنس *Poecila* هو لون الزعنفة الظهرية حيث أنها آخذة لون قوس المطر مع الميل إلى اللون الأزرق والزعنفة الظهرية طويلة بينما الأنثى ذات لون باهت . سجل هذا النوع من المياه العذبة في مدينتي الهفوف والقطيف وفي المياه المتجمعة في وادي حنيفة غرب مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية .

***Poecilia Reticulata* - 3**

قد يصل طول الجسم في ذكور هذا النوع 30 ملم ، أما طول الأنثى فقد يصل إلى 60 ملم . وهذه الأسماك تشبه سمك البعوض إلا أنه لا توجد بقع داكنة على الزعنفة الذيلية . وينتشر هذا النوع في القطيف والأحساء وحول مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية .

***Xiphophorus Maculatus* - 4**

يتراوح عدد الدعائم الشعاعية ما بين (10) إلى (12) في الزعنفة الظهرية لأفراد هذا النوع . الدعامة الشعاعية الأولى في الزعنفة الشرجية متحورة إلى عضو ولوج في الذكور . سجل هذا النوع من مياه عيون القطيف وفي وادي حنيفة غرب مدينة الرياض .

عائلة **Family : Gobiidae**

بالرغم من أن المواطن الأساسية لأفراد هذه العائلة المياه البحرية إلا أنها قد تتواجد في المياه العذبة خاصة المصارف المائية التي تتصل في المياه البحرية حيث وجدت في مياه بعض العيون في واحة القطيف بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية . توجد للأسماك زعنفتان ظهريتان والزعانف الحوضية ملتحمة لتكون ممص بطني .

Bathygobius Fuscus

يتميز هذا النوع بوجود زعنفتان ظهريتان وكذلك وجود (7) دعائم شعاعية غير متفرعة في الزعنفة الظهرية و (9) دعائم متفرعة . أما الزعنفة الشرجية فيوجد بها دعامة شعاعية غير متفرعة و (9) دعائم شعاعية متفرعة . ويوجد على الخط الجانبي ما بين (38) و (40) حرشفة .

عائلة **Family : Mugilidae**

يوجد لأفراد هذه العائلة زعنفتان ظهريتان والزعانف الحوضية منفصلة ولا يتشكل ممص بطني كما في عائلة **Gobiidae** .

Mugil Cephalus

الجسم انسيابي . ولأفراد هذا النوع زعنفتان ظهريتان . قد يصل طول الجسم (500 ملم) . للزعانف الظهرية ما بين (4) و (6) دعائم شعاعية غير متفرعة و (8) دعائم شعاعية متفرعة . يوجد بالزعنفة الشرجية ثلاث دعائم غير متفرعة وثمان دعائم متفرعة . ويوجد ما بين (38) و (42) حرشفة على الخط الجانبي . توجد أفراد هذا النوع في قنوات الري والصرف في واحة الأحساء وبدأت تنافسها أسماك البلطي **Oerochromis Spp.** في موطنها الأصلي .

Family : Cichlidae عائلة

تتميز هذه العائلة بوجود زعنفة ظهرية واحدة . الملامس في أفراد هذه العائلة أقل من ثلاثة . تتميز الزعانف خاصة الظهرية بوجود عدد من الأشواك القاسية والحادة وغير متفرعة . كما أن الفكوك تكثر عليها الأسنان .

Oreochromis Aureus . 1

قد يصل طول الجسم إلى 400 ملم . يوجد في الزعنفة الظهرية (16) دعامة شعاعية غير متفرعة (أشواك) و (12) دعامة شعاعية متفرعة بينما يوجد في الزعنفة الشرجية (3) أشواك و (8) دعامة شعاعية متفرعة . ويتراوح عدد الأسنان الخيشومية ما بين (18) و (26) على الجزء السفلي من القوس الخيشومي الأول . سجل هذا النوع من المياه العذبة في الأحساء وغرب مدينة الرياض وهو من الأنواع غير المحلية .

Oreochromis Mossambicus . 2

تدعم الزعنفة الظهرية في أفراد هذا النوع بدعائم متفرعة وأخرى غير متفرعة ، وقد بلغ عدد الأشواك (16) شوكة وعدد الدعائم الشعاعية غير المتفرعة ما بين (10) و (13) شوكة . أما عدد الأشواك في الزعنفة الشرجية فقد بلغ (3) بينما الدعائم المتفرعة تتراوح ما بين (9) و (12) دعامة . ويوجد ما بين (16) و (19) سن خيشومي على الجزء الأسفل من القوس الخيشومي الأول . سجل تواجد هذا النوع في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية .

Oreochromis Niloticus . 3

يوجد في الزعنفة الظهرية (17) شوكة وما بين (12) و (14) دعامة شعاعية متفرعة . تدعم الزعنفة الشرجية (3) دعائم غير متفرعة (أشواك) و (9) دعائم شعاعية متفرعة . ويوجد ما بين (31) و (33) حرشفة على طول الخط الجانبي وكذلك ما بين (20) و (26) سن خيشومي على الجزء الأسفل من القوس الخيشومي الأول . هذا النوع أدخل إلى المياه العذبة في المملكة العربية السعودية لتربيته اقتصادياً أو للحد من نمو الغطاء النباتي في قنوات الري ، وينتشر في المياه العذبة في مدينة الهفوف والقطيف ومياه وادي حنيفة وسد وادي جازان وقد يكون في مناطق أخرى .

عائلة القرموط Family : Clariidae

تتميز أفراد هذه العائلة بوجود زعنفة ظهرية واحدة وبأن الزعنفتين الظهرية والشرجية طويلتين ، كما يوجد أربعة أزواج من الملامس حول الفم .

Clarias Gariepinus

تتميز أفراد هذا النوع بزعنفة ظهرية طويلة ومدعمة بأكثر من (30) دعامة شعاعية وكذلك بزعنفتين مخرجيتين طويلتين خاليتين من الأشواك . يوجد حول منطقة الفم أربعة أزواج من الملامس . أدخل هذا النوع إلى المملكة العربية السعودية من أجل تربيته والاستفادة منه اقتصادياً . وقد سجل في مياه وادي حنيفة غرب مدينة الرياض .

أسماك المياه المالحة Marine fishes

تحاط المملكة العربية السعودية من الجهة الغربية بالبحر الأحمر ومن الجهة الشرقية يحيط بها الخليج العربي . وتتصل مياهها بمياه المحيط الهندي وترتبط مياه البحر الأحمر بمياه البحر الأبيض المتوسط من الشمال عبر قناة السويس مما يعني أن التنوع السمكي في البحر الأحمر والخليج العربي عبارة عن مزيج من التنوع السمكي في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي وما يصل إليهما من المحيطات والبحار المجاورة فالمياه المالحة تختلف عن المياه العذبة في كونها شبكة متصلة من المياه وبالتالي تتعدد الأنواع السمكية التي تعيش فيها. يصل طول البحر الأحمر 2000 كلم ، ويبلغ أقصر عرض له 352 كلم بالقرب من جازان بالمملكة العربية السعودية ، ويتراوح عمقه ما بين 500 م و 2500 م . أما الخليج العربي فيصل طوله إلى 1000 كلم وعرضه يتراوح ما بين 200 كلم و 300 كلم ، ويتراوح عمقه ما بين 35 م و 100 م عند مضيق هرمز . يتوافر العديد من الأنواع السمكية في المياه المالحة المحيطة بشبه الجزيرة العربية ، فقد سجل (325) نوعاً حتى الآن من البحر الأحمر منها (180) نوعاً سجلت من الأسواق المتخصصة في بيع الأسماك في المملكة العربية السعودية . أما الأنواع السمكية في الخليج العربي فبلغ عددها (400) نوع منها (110) أنواع سجلت من الأسواق المحلية الخاصة ببيع الأسماك الطازجة في المملكة العربية السعودية . ونظراً لتعدد الأنواع في البحر الأحمر والخليج العربي فسوف يكون التركيز في هذا الفصل على الخصائص العامة للعوائل المعروفة والمتواجدة في كل من البحر الأحمر والخليج العربي فقط دون التطرق إلى صفات الأنواع . ويمكن التعرف على الأنواع المتعددة في العوائل المختلفة بالرجوع إلى الدليل الذي أعده Fischer و Bianchi في عام 1984م عن أسماك المحيط الهندي (منطقة 51) وكذلك كتاب Randall في عام 1983م عن أسماك البحر الأحمر ، وكتاب الأسماك التجارية في المملكة العربية السعودية الذي حرره Wary في عام 1979م وكذلك الكتاب الذي أعده Kuronuma و Abe في عام 1986م عن أسماك الخليج العربي وكذلك المصور الذي أعده Randall و Heemstra عن أسماك الهامور . بالإضافة إلى كتاب مقدمة في علوم الأسماك والمصايد الذي أعده الأستاذ الدكتور محمد ابن شاكر حيث شمل فهرساً مصوراً لأهم عائلات الأسماك العظمية في المياه الفطرية .

Families Of Cartiligenous Fishes (Chondrichthyes)

1 . عائلة القرش (الجرجور) Carcharhinidae (Requiem Sharks)

2 . عائلة السّفن Dasyatididae (Sting Rays)

3 . عائلة Rhynchobatidae

4 . عائلة Rhinobatidae (Guitar Fishes)

5 . العائلة المنشارية Pristidae (Sawfishes)

6 . عائلة الرعاش الكهربائي Torpedinidae (Electric Ray)

7 . عائلة Gymnuridae

8 . عائلة Myliobatididae (Eagle Ray)

9 . عائلة المانتا Mobulidae (Mantas)

10 . عائلة قرش الحوت Rhinocodontidae (Whale Shark)

11 . عائلة Hemigaleidae

12 . عائلة أبو مطرقة Sphyrnidae (Hammer Head)

Families of Bony Fishes (Osteichthyes)

- 1 . عائلة السردين Clupeidae (Herrings & Sardines)
- 2 . عائلة الأسماك شبيهة السحلية Synodotidae (Lizard fishes)
- 3 . عائلة الشاقة Muraenidae (Morays)
- 4 . عائلة أنقليس القنجر Congridae (Conger eels)
- 5 . عائلة الانقليس شبيه القرموط Plotosidae (Eel catfishes)
- 6 . عائلة الأسماك إبرية الجسم Belonidae (Needles fishes)
- 7 . عائلة نصفية المنقار Hemiramphidae (Halfbeaks)
- 8 . عائلة فضية الخط Atherinidae (Silversides)
- 9 . عائلة عائله Fistulariidae (Cornetfishes)

عائلة الأسماك أنبوبية الجسم وحصن البحر

Syngnathidae (Pipefishes & Seahorses)

عائلة شبيهة الضفادع Antennariidae (Frogfishes)

عائلة الأسماك المضيئة Anomalopidae (Flashlight Fishes)

عائلة الأسماك سنجابية الجسم Holocentridae (Squirrelfishes)

عائلة شبيهة العقرب Scorpaenidae (Scorpion Fishes)

عائلة الهامور وذئاب البحر Serranidae (Groupers & Seabasses)

عائلة صابونية الشكل Grammistidae (Soap Fishes)

عائلة واسعات العين Priacanthidae (Bigeyes)

عائلة الأسماك شبيهة الصقر Cirrhitidae (Hawk Fishes)

عائلة الأسماك المنقطة Pseudochromidae (Dottybacks)

عائلة الأسماك طويلة الزعانف Plesiopidae (Long Fins)

عائلة Apogonidae (Cardinal Fishes)

عائلة البياض Carangidae (Jacks)

عائلة أسماك الحمراء : Lutjanidae (Snappers)

عائلة Caesionidae (Fulsiliers)

عائلة السبيتي Haemulidae (Grunts)

- Lethrinidae (Emperors) عائلة الشعري
- Sparidae (porgies) عائلة
- Nemipteridae (threadfin Breems & spinecheexs) عائلة الشعم (الحفار - السبيطي)
- Kyphosidae (seachubs) عائلة
- Ehippidae (Spadefishes) عائلة الأسماك شبيهة الخفاش
- Monodactylidae (Monos) عائلة
- Pempherididae (sweepers) عائلة
- Bothidae (Left-eye flounders) عائلة نوات العين اليسرى
- Soleidae (Soles) عائلة سمك موسى
- Mullidae (Goatfishes) عائلة أبو دقن (سمك إبراهيم)
- Malacanthidae (sand tilefishes) عائلة
- Mugiloididae (Sandperches) عائلة
- Echeneididae (Remoras) عائلة اللزاق (الريمورا)
- Gerrpidae (Mojarras) عائلة
- Mugilidae (Mulletts) عائلة أسماك العربي
- Sphyraenidae (Barracudas) عائلة العقام
- Pomacentridae (Damsel fishes) عائلة
- Labridae (Wrasses) عائلة
- Scaridae (Parrotfishes) عائلة أسماك شبيهة البيغاء

- Chaetodontidae (Butterfly fishes) عائلة الأسماك شبيهة الفراشة**
- Pomacanthidae (Angelfishes) عائلة**
- Acanthuridae (Sturgeon fishes) عائلة**
- Siganidae (Rabbit fishes) عائلة الصافي (السيجان)**
- Blennidae (Blennies) عائلة**
- Gobiidae (Gobies) عائلة القبيون**
- Balistidae (Trigger fishes) عائلة القادوح**
- Monacanthidae (File fishes) عائلة**
- Ostraciidae (trunk or box fishes) عائلة الأسماك صندوقية الشكل**
- Tetraodontidae (Puffers) عائلة الأسماك المنتفخة**
- Diodontidae (Burrfishes & Procupinefishes) عائلة**
- Scombridae (Mackerels & tunas) عائلة الكنعد والتونة**
- Ariidae عائلة القرموط البحري**
- Ariommidae عائلة الأسماك المنجرفة**
- Chanidae عائلة السلماتي**
- Chirocentridae عائلة أسماك الجف**
- Exocoetidae عائلة الأسماك الطائرة**
- Formionidae عائلة الحلواي**
- Istiophoridae عائلة الأسماك الشراعية**

Leionathidae عائلة الأسماك الغروية

Muraenesocidae عائلة الأنتليس

Nemipteridae عائلة

Pomadasyidae عائلة

Platacidae عائلة الأسماك شبيهة الوطواط

Platycephalidae عائلة مسطحة الرأس

Psettodeidae عائلة

Rachycentridae عائلة

Sillaginidae عائلة الحاسوم

Stromadeidae عائلة الزبيدي

Theraponidae عائلة

Dorosomatidae عائلة الشروم

Albulidae عائلة البنك

تربية الأسماك

FISH CULTURE

تربية (الاستزراع السمكي) الأسماك

مفهوم الاستزراع السمكي (تربية الأسماك)

استخدم مفهوم الاستزراع السمكي منذ القدم في جنوب شرق آسيا عندما بُدء في تربية بعض أسماك المياه العذبة كسمك المبروك **Carp** والسِّلور **Catfish** والقشريات كالربيان والصدفيات كالمحار لتأمين بعض الاحتياجات البشرية في تلك القارة من البروتين الحيواني ، وزاد هذا الاهتمام في أوائل القرن العشرين عندما بدأ كميات الصيد من الأسماك من البحار في الانخفاض حيث ظهرت الحاجة الماسة إلى موارد غذائية بديلة لسد النقص في حاجة البشرية في مختلف بقاع الأرض إلى التنوع في البروتين الحيواني .

وبذلك يمكن أن يطلق على الاستزراع السمكي بأنه عبارة عن عملية تربية الأسماك والكائنات المائية الأخرى في بيئة مائية محدودة المساحة بعد التحكم في نوع الماء وكمية الغذاء التي تتناولها الأسماك والسيطرة على العوامل الفيزيائية والكيميائية والأحيائية لكي يتم الحصول على إنتاج سمكي أوفر بأقل تكلفة في الجهد والمال

الهدف من تربية الأسماك

تُربى الأسماك في البرك والبحيرات والأقفاص في البحر أو في مساحات مختارة من البحار والمحيطات لكي تُحقق الأغراض التالية :

- 1 - **تأمين مصدر غذائي محلي** مثل ما يحدث في المملكة العربية السعودية حيث تربي أسماك البلطي النيلي Nile Tilapia وأسماك المبروك Carp وأسماك السلّور Catfish لتنويع مصادر الغذاء في المملكة .
- 2 - **تحسين المخزون السمكي في المياه الطبيعية** إما بغرض سد حاجة الاستهلاك المحلي أو للتصدير كما يحدث في معظم المزارع السمكية في جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول التي تطل على مسطحات مائية عذبة كبيرة .
- 3 - **استخدام الأسماك في مجال مكافحة الحيوية** مثل ما يحدث في المملكة العربية السعودية حيث جلبت بعض الأسماك كالبلطي وسمك البعوض Gambusia للتخلص من النباتات المائية ويرقات البعوض .
- 4 - **لأغراض السياحة والرياضة** حيث تنتشر هواة رياضة صيد الأسماك في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وبعض الدول الآسيوية والتي تعتمد على تربية بعض الأسماك كسمكة التروت التي تصطاد من أجل ممارسة رياضة الصيد في بعض الأنهار والجداول المائية الصغيرة .
- 5 - **للتربية للزينة حيث تكثر تربية الأسماك في دول آسيا مثل تايلندا** ، حيث يهتم المشتغلون في هذه التجارة بالسلالات الجيدة من الأسماك الملونة التي تصدر إلى مختلف دول العالم .
- 6 - **للأغراض التجارية حيث تصدر من أجل الغذاء** ، تباع كطعوم لصيد الأسماك المحلية والتي تحاكي الغذاء الطبيعي للأسماك المصادة أو تربي الأسماك لاستخدامها كأعلاف للحيوانات الداخلية أو الاعتماد على منتجاتها في الصناعات مثل كيتين قشور الأسماك والقشريات البحرية والمستخدم في مستحضرات التجميل .

أنواع المرابي (المزارع) السمكية

يعتمد تقسيم المرابي السمكية حسب ما ذكره محمود (1998م) على عدة عوامل منها درجة الملوحة وحركته وبذلك قسمت المرابي السمكية إلى الأقسام التالية :

1 - حسب درجة الملوحة :

أ - مرابي الأسماك في المياه المالحة :

ويتم في هذا النوع من المرابي استخدام مياه البحار والمحيطات والتي تتراوح ملوحتها ما بين 32-41 % ، وعادة ما تستخدم فيها المسيجات البحرية والأقفاص العائمة لتربية الأسماك مثل أسماك الهامور والصفافي .

ب - مرابي الأسماك في المياه العذبة

وتستخدم في هذه المرابي مياه الينابيع والآبار والأنهار والتي تتراوح ملوحتها ما بين 3-5 % لتربية الأسماك مثل أسماك الشبوط (المبروك) والبلطي .

ج - مرابي الأسماك في المياه المويحلة

وهي مرابي تعتمد على خليط من المياه المالحة والمياه العذبة قد تصل ملوحتها إلى 10 % .

2 - حسب حركة الماء :

أ - مرابي الأسماك في المياه الجارية

ويتم فيها بناء عدة أسيجة في مواقع مختارة من المجرى المائي حيث تستخدم هذه المواقع في تربية الأسماك في المياه الجارية مثل أسماك التروت المنقط .

ب - مرابي الأسماك في المياه الراكدة

ويقصد بها مياه البرك والسدود الترابية وسدود حجز مياه الفيضانات والأحواض الخرسانية المستطيلة والدائرية والتي إما تكون بنظام الري والصرف المفتوح أو تكون مغلقة وتربي بها أسماك المبروك والسَّلور .

ينقسم غذاء الأسماك المرباة في البرك والبحيرات والأنهار والخلجان البحرية إلى الأقسام التالية :

أ - غذاء طبيعي

يتكون هذا النوع من الغذاء من ما يحتويه الوسط الذي تربي فيه الأسماك من عوالق حيوانية صغيرة وعوالق نباتية وبعض النباتات المائية الصغيرة وبعض الحشرات المائية وصغار الأسماك .

تتنوع الأسماك المرباة في غذائها الطبيعي فمثلاً يتغذى سمك المبروك (الشبوط) الفضي Silver Carp على العوالق النباتية بينما يتغذى سمك المبروك كبير الرأس Bigheal Carp على العوالق الحيوانية وتختلف صغار الأسماك في غذائها على كبارها فمثلاً تتغذى صغار سمك البلطي النيلي Nile Tilapia على العوالق الحيوانية بينما تعتمد الأسماك البالغة على العوالق النباتية في غذائها . ويتم تحفيز نمو الغذاء الطبيعي للأسماك عن طريق التسميد والذي يتكون من الأسمدة العضوية لفضلات الدجاج وروث الماشية أو الأسمدة المعدنية كالأسمدة النيتروجينية والأسمدة الفوسفورية بشقيها المفرد والمخلوط والذي يتكون من كميات مناسبة (مثل اليوريا) من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم ، وأشار يوسف وعبد السميع (1996م) إلى أن بعض العلماء المتخصصين في تربية الأسماك على أن الماء يشكل 85.8 % والبروتين 7.4 % والكربوهيدرات 3.8 % والدهون 1.7 % من الغذاء الطبيعي للأسماك بالإضافة إلى أنه يكون غنياً بالفيتامينات والمعادن .

ب - الأغذية المصنعة

وهي عبارة عن الأغذية الإضافية التي تُصنع وتضاف إلى الوسط الذي تعيش فيه الأسماك لزيادة نموها للحصول على إنتاجية عالية في أقل فترة زمنية ، ويجب دراسة المكونات البروتينية والكربوهيدراتية والدهنية للغذاء بدقة نظراً لاختلاف متطلبات الأسماك الغذائية فمثلاً تحتاج معظم الأسماك لغذاء إضافياً تتراوح نسبة البروتين فيه ما بين 30-35 % ويعتمد كل نوع واحد من الأسماك على نوع خاص من العلائق لتوفير غذاء مناسب لنموه يكون محتوياً على نسب معروفة من البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والأملاح المعدنية .

تلوث مياه مرابي الأسماك

تتعرض أماكن تربية الأسماك سواء كانت البرك أو الأنهار أو المسطحات البحرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى ملوثات متعددة . ولعل ما أشار إليه محسن في عام 1988م يلخص ملوثات البيئة المائية في ما يلي :

- 1 . مواد غير عضوية خاملة مثل الطمي .
- 2 . مواد عضوية من نفايات مصانع الأغذية والصرف الصحي .
- 3 . المبيدات .
- 4 . النفط .
- 5 . النفايات اللاعضوية كالمعادن الثقيلة .
- 6 . النشاط الإشعاعي .
- 7 . التلوث الحراري الناتج عن توليد الطاقة الكهربائية .
- 8 . الصرف الصحي .

طرق معالجة تلوث مياه مرابي الأسماك

يمكن اقتباس بعض الطرق لمعالجة تلوث مياه أحواض ومسيجات تربية الأسماك من الطرق التي ذكرها بالتفصيل السعدي وآخرون (1986م) وذلك على النحو التالي :

1 . الطرق الميكانيكية

تستخدم المناخل أو المصافي والمرشحات المصممة لهذا الغرض للتخلص من الشوائب والمواد العالقة غير الذائبة الكبيرة والصغيرة وللحصول على تنقية أكثر للماء . يستخدم الترسيب والترشيح والإدمصاص والتبخير في التخلص من مخلفات الصناعات الكيماوية ، بينما تعزل الدهون والنفط بعملياتي التعويم والكشط ، وللتخلص من المبيدات يستخدم الكربون المنشط الحبيبي .

2 . الطرق الكيماوية :

وبالرغم من أن هذه الطرق لا ينصح باستخدامها في مرابي الأسماك نظراً لخطورة هذه المعالجة على حياة الأسماك إلا أنه يمكن الاستفادة منها قبل استخدام المياه في تربية الأسماك وإضافة الكلورين لمعالجة مياه الصرف الصحي قبل استعمالها في تربية الأسماك على أن يشترط نقاوة هذه المياه قبل السماح باستخدام الأسماك في الغذاء البشري .

3 . الطرق الأحيائية :

تعتمد هذه الطرق على تحليل المواد العضوية بواسطة الكائنات الدقيقة كما يحدث ذاتياً في مجاري الأنهار والبرك والبحيرات والبحار عند اختلاط مياهها بالملوثات عند توفر التهوية الجيدة ودفء الجو ووجود البكتيريا الهوائية ، وأحياناً يتم خلط الماء بالغريرين (الطمي) والتي تتواجد بها البكتيرياالنتم عملية الأكسدة ويتم بعد ذلك تنقية المياه الملوثة من ما علق به من طمي مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تدمير خياشيم الأسماك بالطمي .

اهمية الثروة السمكية

1- تأمين الغذاء

2- الدخل

3- انواع الأسماك من حيث الدهون

• دهنية (لون داكن) - السلور

• الاصداف (ابيض) - الروبيان

• لحمية (ابيض) - البلطي

3- تصنيع الاسماك - انتاج للاستهلاك (تمليح-تبريد- تغليف)

• انتاج لغير الاستهلاك (صابون وادوية)

4- المكافحة الحيوية

5- مؤشرات تلوث

ملحوظة

Zebra fish - التركيب الوراثي ودراسة السرطان