

شقيق نسيم الموسى

د. أمل الموسى
٢٠١٤٢٢٩٣

دراسة الصفات المزجعية والمورفولوجية المستعمرات الفطرية
الرقم الجامعي:

اسم الطالبة:

الجنس	جدار الجرثومة (الملاحم)	شكل الجرثومة	شكل الرأس الكويندي	الحامد الكويندي	الميسليوم (متفرع / غير متفرع)	قوام المستعمرة (مظاهرها)	لون خلف المستعمرة (الوسط والأطراف)	لون وجه المستعمرة (الوسط والأطراف)


شقيق نسيم الموسى

خواص النمو (الخواص المزرعية) المستخدمة في التعرف على البكتيريا


Grwth(cultural) characteristics used in the identification of bacteria

أعلى ملمسه


- ١- شكل المستعمرات البكتيرية configuration : يمكن للمستعمرات البكتيرية ، على سطبات الصلبة ، ان تأخذ احد الاشكال المبينة في اللوحة الآتية :



- ٢- ارتفاع المستعمرات البكتيرية : يمكن ان يكون ارتفاع elevation للمستعمرات البكتيرية من سطح المستتب الصلب احد الاشكال المبينة في اللوحة التالية :



- ٣- شكل حافة المستعمرات البكتيرية margins : تبين اللوحة التالية اشكال حواضن المستعمرات البكتيرية



٤- سطح المستعمرة البكتيرية surface : يمكن ان يوصف سطح المستعمرة بأنه

(أ) ناعم (املس) smooth .

(ب) خشن rough .

٥- حجم المستعمرة البكتيرية : ويمكن قياسه بالمليمتر (او نسبياً صغيرة او متوسطة او كبيرة الحجم) .

٦- الصفات الضوئية والشفافية للمستعمرة optical features .

(أ) شفافة traslucent .

(ب) نصف شفافة semitranslucent .

(ج) معتمة opaque .

٧- قوام المستعمرة البكتيرية consistency و توصف بانها :

(أ) لزجة viscoid : يعلق النمو البكتيري عند لمسة بالأبرة .

(ب) غشائية membranous .

(ج) هشة brittle .

٨- كمية النمو البكتيري .

(أ) ضئيل scanty .

(ب) متوسط moderate .

(ج) غزير abundant .

٩- انتاج الصبغات chromogenesis ، ويشمل ذلك وصف ما اذا كانت المستعمرات بكتيرية ذات لون معين او ان هناك صبغة ذات لون معين تغطي سطح المستبنت نتيجة نمو ذلك النوع من البكتيريا . معظم اجناس البكتيريا لا تنتج صبغات ويكون نموها بغض اللون ، البعض الآخر يعطى الوانا مختلفة . بعض الصبغات تنتشر بالمستبنت يمكن مشاهدة اللون او الصبغة باستخدام ضوء ساطع .

١٠- الرائحة :

(أ) اي ان يكون للنمو البكتيري رائحة مميزة مشابهة لرائحة مادة اخرى معروفة .

(ب) او ليس له رائحة .