المحاضرة الثانية

أنواع الأوساط الغذائية Media وخصائصها

1- Chocolate Agar

- بيئة غنية Enriched Media تنمو عليها أغلب البكتيريا
- تحتوي على عوامل X و V الناتجة من تفجر كريات الدم الحمراء RBCs والتي يمكن من خلالها نمو *Neisseriae* و *Haemophilus spp* والتي تعتبر هذه الأنواع من البكتيريا صعبة النمو. Fastidious

2- Blood Agar

- بيئة غنية Enriched Media تنمو عليها معظم البكتيريا
- بيئة تفرقية Differential بين أنواع البكتيريا المحللة للدم عن طريق التحلل الكامل للدم Beta hemolytic مثل *Sterpt. Pyogenes* و Alpha hemolytic مثل *Sterpt. Agalactiae* أو التحلل الجزئي للدم مثل *Sterpt. Viridans* و *Sterpt. Pneumonia* مثل Non hemolytic مثل *Sterpt. Bovis* و *Sterpt. Faecalis*

3- MacConkey Agar

- بيئة تفرقية للتفريق بين البكتيريا المخمرة للاكتوز Lactose fermenting والتي تأخذ اللون الأحمر مثل E.coli و Klebsiella و Enterobacter، وبين البكتيريا الغير مخمرة للاكتوز Non-lactose fermenting والتي ليس لها لون (شفاف) مثل Proteus و Salmonella و Shigella.
- تحتوي على Crystal violet أو Bile Salts بحيث تسمح للبكتيريا السالبة لصبغة جرام بالنمو وتثبط نمو الموجبة لصبغة جرام

4- (stine Lactose electrolyte deficient (CLEED

• وسط لزراعة عينات الجهاز البولي.

• بيئة تفرقية للتفريق بين البكتيريا المخمرة للاكتوز Lactose fermenting والتي تأخذ اللون الأصفر مثل E.coli ، وبين البكتيريا الغير مخمرة للاكتوز Non-lactose fermenting والتي ليس لها لون (شفاف) مثل Acnitobacter بسبب وجود الكاشف Bromo-thymol blue .

• لها نفس وظيفة الـ MacConkey Agar

5- (Xylose lysine deoxycholate (XLD

● بيئة اختيارية تفرقية لـ *Shigella* و *Salmonella* حيث أن الـ *Salmonella* تأخذ اللون الوردي لوجود Phenol Red مع وجود لون أسود في المركز نتيجة تحلل مواد موجودة في البيئة ينتج عنها غاز H₂S والـ *Shigella* تأخذ مستعمراتها اللون الوردي فقط.

6- Salmonella Agar (S.S Agar) Shigella

● بيئة اختيارية لا تسمح بنمو البكتيريا الموجبة لصبغة جرام وبعض البكتيريا السالبة لصبغة جرام ماعدا *Salmonella Shigella* بسبب وجود Na-citrate & bile salts

● بيئة تفرقية لـ *Shigella* و *Salmonella* حيث أن الـ *Salmonella* تأخذ لون البيئة (شفاف) مع وجود لون أسود في المركز نتيجة تحلل مواد موجودة في البيئة ينتج عنها غاز H₂S والـ *Shigella* تأخذ مستعمراتها لون الوسط (شفاف).

7- (Mannitol salt Agar (MSA

- بيئة تفرقية للتفریق بين *Staphylococcus species* و *Staphylococcus aureus* التي تخمر المانيتول بتأثيرها على لون الكاشف Phenol Red وتعطي اللون الأصفر بينما الـ *Staph.* الأخرى لا تخمر المانيتول.
- بيئة اختيارية لأن تركيز الأملاح العالي (NaCl 7.5%) الموجود فيه يثبط نمو الميكروبات الأخرى.

8- (Thiosulphate citrate bile salt Agar (TCBS

- بيئة اختيارية لعزل الكوليرا *Vibrio Cholerae*
- تثبط نمو معظم الـ *Enterbacteria* والبكتيريا الموجبة لصبغة جرام بسبب احتوائها على مواد مثبطة وكذلك قلوية PH الوسط العالية.

9- Mueller Hinton Agar

- بيئة ضعيفة المواد الغذائية.
- مناسبة لعمل اختبارات الحساسية لأنها لا تحتوي على أية نسب من المواد الكيميائية بحيث لا تتفاعل مع المضادات الحيوية.

10- Bile Esculine

- بيئة تفرقية بين الأنواع المختلفة من الـ *Streptococcus* و الـ *Enterococcus (Strept. Faecalis)* التي تفرز عند نموها على هذه البيئة إنزيماً يفك مادة الأسكولين فيتشكل مركب أسكولتين والذي يتحد مع أيونات الحديد الموجود بالبيئة على شكل سترات الحديد ويتكون مركب اسود يدل على وجود *Enterococcus*
- أيضاً وجود (٤% أملاح الصفراء) يثبط الكثير من البكتيريا دون أن يؤثر على نمو *Enterococcus*.

- 11- (Sabouroud Dextrose Agar (SDA**
● بيئة اختيارية لنمو الفطريات.
● ال PH حامضي لذلك لا تسمح بنمو البكتيريا.

جدول يوضح العينات الطبية والأوساط المفضلة لزراعتها كما يُعمل به في كثير من المستشفيات

خطأ!

أهم انواع العينات والأوساط الغذائيه المفضله لزراعتها طبياً

specimens	mac conkey	blood Agar	chocolate Agar	XLD Agar	ded Agar	mannitol saltAgar
sputun	●	●	●			
Throat	●	●	●			
Nasal	●	●	●			
Ear	●	●	●			
Tracheal aspiration	●	●	●			
Urethral saeb	●	●	●			
Semen	●	●	●			
wound or pus sawb	●	●				
Umbilical sawb	●	●	And also culture on Thiol broth			
Placental Sawb	●	●				
HVS	●	●	And also culture on Anaerobic blood agar			
ECS	●	●				
Pericardial fluid	●	●	●			
Pleural fluid	●	●	●			
Peritoneal Fluid	●	●	●			
Ascitic Fluid	●	●	●			
Synovial Fluid		●	●			

خطأ!

أهم انواع العينات والأوساط الغذائية المفضله لزرعتها طبياً

specimens	mac conkey	blood Agar	chocolate Agar	XLD Agar	clad Agar	mannitol salt Agar
Bronchial Washing	●	●	●			
ETT aspirate	●	●	●			
Tracheostomy		●	●			
Tube aspirate	●	●	●			
Urine					●	
Eye swab	●	●	●	And also culture on		
Conjunctiva Swab	●	●	●	Brain Heart Infusion (BHI)		
CSF deposit	●	●	●	And culture on (BHI)		
Stool	●			●	And also culture on	
Rectal Swab	●			●	Selenite F broth	
Anal Swab	●			●		
Blood Culture	●	●	●			
Tip IUCD	●	●				
Pus Sample	●	●	●	And also culture on		
Lung abscess	●	●	●	Thiol borth and Anaerobic B.A. and cooked meat media		
MARSA (Eye, nasal, throat swab)						●

Types of the media and samples

بواسطتي بتعاون مع الأخ HIV

Mac Conkey Agar

Selective medium

"stool , sputum , Eye , Ear , wound , vagina sample "
selective for G -ve bacteria and also Group D in G+ve
bacteria can grows on this media
and differential between lactose fermentation bacteria and
non lactose fermentation bacteria

CLED Agar

Used on Urine samples

for G+Ve and G-Ve bacteria

properties:- Inhibition Proteus Swarming Species on this
media like Mac Conkey media

CLED in the upper part of the media which seen in the
picture below

and the other one is Horse blood agar

XLD medium

Used on stool sample

XLD selective media for G -ve bacteria

and differential for lactose ferment and non lactose ferment

Chocolate Agar

for Haemophilus & Neissria

and also another bacteria which grow in blood agar can
grow in this agar easily

" sputum , Eye , Ear , blood , nasal , csf sample "

Blood Agar

"sputum , Eye , Ear , nasal , blood , wound , vagina"

Most of the bacteria can grow in this media

and we dont use this media in stool sample

Manitol salt Agar

Used in suspected (Nosocomial infection) " MRSA" (Eye ,

nasal , throat samples)

Mueller Hinton agar
Used for sensitivity tests

DNase Agar
Biochemical test
used for differentiate between Staph.aureus and Staph species

T.C.B.S medium
for Vibrio Species
The high of PH in this media allows growing of vibrio SSP

Thyer Martin Medium
For Neisseria gonorrhoea
samples from vagina and penis
and in uncommon area like oral cavity and anal canal

Sterilization of Media

تعقيم الأوساط الغذائية

- *All media are sterilized by moist heat only; there is no dry heat sterilization (160c/2hours) or (170c/1.5 hour).
- *The most common sterilization of media by autoclave (121c/15minute).
Autoclave is part of moist heat sterilization.
- *Sterilization by inspissations (80c) for example: L J media.
- *membrane filtration for thermolabile for example: Christian media for urease test.
- *most of the selective media are sterilized by boiling (No autoclave)

المحاضرة الثالثة

المزارع البكتيرية

مكونات المزارع البكتيرية وتحضيرها

تمثل الاوساط الزراعية للبكتيريا العنصر الغذائي من متطلبات النمو ولذلك فان هناك انواعا كثيرة مختلفة من حيث المحتوى الغذائي بحيث يواجه متطلبات نمو انواع شتى من البكتيريا ، وتصنف الاوساط الزراعية حسب قوامها الى صنفين هما :

الوساط الصلبة (شبه الصلبة)

وهذه تشبه في شكلها وقوامها الجلي . وسبب صلابتها هو اضافته ماده الاجار اليها التي تقوم بتصليب الوسط ولا يتدخل في التغذية ابدا ولذلك تسمى احيانا هذه الاوساط .

الوساط السائلة

وهذه الاساك قد تحتوي على نفس المواد الغذائية في الوسك الصلب لكن بدون مادة تصليب. نصب النوع الاول في اطباق خاصة تسمى اطباق بتري ، بينما نصب الثانيه في انابيب زجاجيه او قناني لسهولة التداول. اما من ناحية المحتوى الكيماوي فان الاوساط تنقسم الى الاقسام التاليه :

١- الاوساط البسيطة الطبيعیه

وهذه تواجه متطلبات نمو البكتيريا ذاتية التغذية ، وبعضها غير ذاتية التغذية ، وتحتوي مركبات غذائية بسيطة .

٢- الاوساط الغنية

وهذه الاوساط العادية البسيطة مضافا اليها مواد غذائية غنية اضافية مثل الدم والمصل او مستخلصات النباتات او الحيوانات لمواجهة متطلبات نمو الجراثيم صعبة الارضاء .

٣- الاوساط الاختياريه

اضافة مواد كيماوية معينة بتركيز معين يؤدي الى السماح لنمو مجموعة من البكتيريا ، ومنع نمو مجموعة اخرى مثل اضافة صبغة جرام ، بتركيز محدد مثال ذلك :

الوساط المفرقة

الوساط الذي يسمح لنمو نوعين من البكتيريا بحيث يستطيع المشاهد ان يميز بينهما لظهورهما بصفات مختلفة، مثل اضافة الدم الى الوسط الزراعي يؤدي الى التمييز بين البكتيريا المحللة من البكتيريا غير المحللة له ، حيث تظهر حلقة فارغة من الدم حول المستعمرة اذا كانت الخلية البكتيرية من النوع المحلل للدم بينما لا تظهر حلقة شفافة حول المستعمرة في حالي ما تكون البكتيريا غير المحللة للدم وبذلك تلعب الاوساط المحتوية على الدم دور الوسط الغني والمفرق في نفس الوقت .

هذه هي الانواع الرئيسية الاله، رغم ذلك يوجد انواع اخرى خاصة لخدمة باحث معين ، ونوع لعد الخلايا البكتيرية و(اخرى) لتشخيص صفات بكتيريا معينة .

تحضير الاوساط الزراعية

يمكن تحضير المزارع الجرثومية باتباع الخطوات التالية :

- ١- زن مسحوق الوسط الجاف وحسب التعليمات المثبتة على عبئه الوسط .
- ٢- اذبها في حجم الماء المقطر المحدد في التعليمات ، وغالبا ما يكون لتر وتتم الاذابة اما بالتحريك او قد يحتاج الى التسخين .
- ٣- وزع المحلول (الوسط) في انابيب اختبار وغطها .
- ٤- ضع الانابيب او القارورة (اذا كان الوسط صلبا) في جهاز التعقيم بالبخار لمدة ١٥ دقيقة تحت ضغط ١٥ باوند|انش، ودرجة الحرارة ١٢١ م لهدف التعقيم .
- ٥- اخرجها من الجهاز وانتظر حتى تبرد قليلا وصبها في اطباق معقمه من اطباق بتري في جو خال من تيار هوائي على طاولة نظيفه مظهرة ومحاطة بلهب بنسون مشتعل، وتبقى الاطباق مفتوحة حتى لايتكثف البخار على غطاء الطبق بعد التجميد تحفظ في الثلجة اذا كان الوسط سائلا فلا داعي للصب وتخرج الانابيب من جهاز التعقيم، وينتظر حتى تبرد ثم تحفظ في الثلجة لحين الاستخدام.

أنواع الأوساط هناك نوعان واسعان للأوساط هما كالتالي:

- ١- أوساط سائلة القوام.
- ٢- أوساط صلبة أو متماسكة القوام.

أولاً / أوساط سائلة القوام:

١- ماء البيتون:- Peptone Water

هو عبارة عن وسط بسيط يتكون من ١ % من البيتون و ٠,٥ % من NACL في ماء مقطر يوضع في أنابيب يتم تعقيمها في جهاز الـ AUTOCLAVE الإستخدامات كالتالي : ١ - يعتبر كقاعدة للـ SUGAR MEDIUM ٢ - يستخدم في إختبار الـ INDOL

2-الوسط المغدى باللحم الـ MEAT INFUSION BROTH

عبارة عن ماء بيتون مضاف إليه قطع اللحم متناهية الصغر ويتم ضبط ال PH ليكون مقداره ٧,٢ الإستخدامات كالتالي : ١- يساعد في نمو معظم المايكروبات ويكافئها. ٢- يعتبر قاعدة لوسط. Nutrient agar

-هناك الكثير من العيوب لهذه الأوساط ومن أهمها:-

- ١- النمو لا يملك مواصفات نستطيع أن نميزها بالعين و نفرق بين روائحها بالأنف مثل المواصفات التي تظهر في الأوساط الصلبة لها مميزات في شكلها ولونها ورائحتها.
- ٢- لا يمكن عزل الميكروبات من الوسط السائل لنقوم بعمل إختبارات الـ ديسكات المحتوية على المضادات (test sensitivity) بينما الأوساط الصلبة يمكننا بسهولة عزل المستعمرات التي نمت.

ثانياً / أوساط صلبة القوام:-

الأغلب استخدمنا لعزل مستعمرات بكتيرية نقية لها سبعت أنواع رئيسية ويتفرع منها العديد من الأنواع كالتالي:

A-Simple Media

Nutrient agar medium -1 يستخدم في التالي:

-يساعد في النمو لمعظم البكتيريا.

-يعتبر القاعدة الأساسية لـ selective and enriched media.

Nutrient Gelatin -2 يستخدم في التالي:

تشخيص وتميز الـ The proteolyticmicr organisms

مثل الـ v.cholerae

B-Enrrished Media

يضم العديد من الأوساط المهمة وهو أساسي لإكتشاف العديد من البكتيريا كالتالي:

1- **Blood agar**

يستخدم للتفريق بين العديد من الميكروبات طبقا لتفاعلها و تأثيرها الإنحلالي
-تحلل كامل يحدث مع staph aureus and strept pyogenes
-تحلل جزئي يحدث مع strept viridans and pneumococci

2- Chocolate agar

هو عبارة عن blood agar تم تسخينه.
-يستخدم لـ Neisseria and Haemophilus groups

3- Loffler's serum

-يستخدم لدراسة الـ proteolytic activity of bacteria
-مفيد في زراعة الـ C.diphtheriae

C-Selective Media

تحتوي بعض الصبغات و المضادات و الالكيمواويات التي تمنع نمو بعض البكتيريا وتحفز نمو البعض الآخر.

1- Lowenstein-Jensen medium

يعتبر وسط إختياري يستخدم لنمو فقط الـ Mycobacteria

2- Blood tellurit medium

يعتبر وسط إختياري يستخدم لنمو فقط الـ C.diphtheriae

3- DCA (Desoxycholate Citrate Agar) medium

يعتبر وسط إختياري يستخدم لنمو فقط الـ salmonella and shigella

4- T.C.B.S

يعتبر وسط إختياري يستخدم لنمو فقط الـ V.Choerae

D-Indicator Media

تحتوي على مواد تجعل اللون يختلف حسب الـ PH

1- MacConkey medium

يستخدم للتفريق بين الـ enterobacterae إلى التالي:
- lactose Fermenters - تنتج لون pink على الطبق.
- Non lactos Fermenters لا تنتج لون أو أصفر فاتح.

2- Triple Sugar iron agar

للتفريق بين أنواع البكتيريا التي تقوم بالتفاعل لتنتج لون محدد تعرف به.

E-Enrichment Media

-وهذا النوع من الأوساط يحتوي على مواد تحفز نمو بعض البكتيريا عن البعض الآخر مثل.

Selenite broth-

Tetrathionate broth-

F-LITMUS Media

وفيه يتم تقسيم البكتيريا على حسب فعلها على الحليب قاعدية أو حامضية

G-SUGAR Media

فيه يتم ملاحظة فعل البكتيريا الكيميائي.